

زینک اکساید ۲۵٪

تیوب آلومینیومی ۳۰ گرمی در یک جعبه

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

موارد مصرف

- استفاده به عنوان پوشش محافظ برای تحریکات و ساییدگی های خفیف پوست؛
- استفاده به عنوان تسکین دهنده و محافظ برای بهبود پوست ترک خورده و بثورات پوشک

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف دارو را بر اساس شرایط هر فرد پزشک مشخص میکند اما نحوه مصرف این دارو به شرح ذیل است:

چندین بار در روز به اندازه ی مورد نیاز در نواحی آسیب دیده استفاده کنید.

هشدارها

- اگر شرایط پوستی شما بدتر شد یا در طول چند روز بعدی دوباره رخ داد و یا بعد از یک هفته بهبود نیافت، به پزشک خود اطلاع دهید.
- فقط جهت مصرف خارجی
- از تماس با چشم پرهیز شود.
- در صورت بلعیده شدن این محصول حتما به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه کنید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

مادران باردار و یا شیرده قبل از مصرف این فراورده با پزشک خود مشورت کنند.

موارد منع مصرف

در صورت داشتن حساسیت به اکسید روی یا هر جزء دیگری از فرمولاسیون

تداخلات دارویی و غذایی

هیچ تداخل مهم شناخته شده ای وجود ندارد.

عوارض جانبی

مصرف هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض جانبی و ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز مکرر و آزاردهنده هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

- واکنش حساسیت موضعی
- تحریک موضعی

شرایط نگهداری

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش



تهران - ایران