

مسمومیت

"در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده، سریعاً همراه دارو به مراکز درمانی مراجعه نمایید."

شرایط نگهداری

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش



تهران - ایران

Reference: www.medicines.org.uk/emc

uptodate/UpToDate.2.0.Revision.042018

www.accessdata.fda.gov/fda label

آلرگوژیک®

دس لوراتادین

2.5 mg/5ml

موارد مصرف

حساسیت های فصلی، آبریزش بینی ناشی از حساسیت در کودکان بالای دو سال و کهیرهای مزمن با منشأ نامشخص در کودکان بالای ۶ ماه

راهنمایی های پیش از مصرف

پیش از مصرف این دارو در موارد زیر حتماً با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

- سابقه حساسیت به دس لوراتادین یا لوراتادین یا ترکیبات مندرج
- ابتلا به بیماری های مزمن و یا مصرف سایر داروها

مقدار و نحوه مصرف

مقدار این دارو را پزشک تعیین میکند اما مصرف معمول این دارو به شرح زیر است:

- کودکان ۲-۵ سال ۲/۵ میلی لیتر یکبار در روز
- سنین ۶-۱۱ سال ۵ میلی لیتر یکبار در روز
- بزرگسالان ۱۰ میلی لیتر یکبار در روز

هشدارها

- واکنش های حساسیتی
- بیماران دارای نارسایی کلیوی و کبدی
- در بیمارانی با سابقه تشنج
- در بیمارانی با سابقه کلیوی شدید

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

مصرف این دارو در دوران بارداری، زیر نظر پزشک، مجاز است.
این دارو در خانم های شیرده باید با احتیاط مصرف شود.

موارد منع مصرف

- در کودکان کمتر از دو سال با علائم آبریزش بینی، به این علت که منشأ این آبریزش ها عفونی است نباید استفاده شود و نیازی به تجویز دس لوراتادین وجود ندارد.
- حساسیت به ماده موثره دس لوراتادین یا لوراتادین

تداخلات دارویی

- دس لوراتادین اندکی خواب آور است و مصرف همزمان آن کنار داروهای آرامبخش و الکل میتواند این اثر را بیشتر کند.
- مصرف همزمان دس لوراتادین با داروهایی مانند بوپروپیون، زولپیدم و ... (داروهای کاهنده هوشیاری) سبب تشدید علائم و گاهی کشنده است.

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض جانبی شود که البته در همه افراد دیده نمی شود اما در صورت بروز مکرر یا آزاردهنده عوارض زیر با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

- اسهال، تب، بی خوابی، سر درد، خشکی دهان، خستگی.