

شرکت کارخانجات داروپخش، بزرگترین و باسابقه‌ترین شرکت داروسازی کشور، در سال ۱۳۳۵ با همکاری شرکت انگلیسی Allen & Hanburys تأسیس شد و کارخانه آن در سال ۱۳۴۲ افتتاح گردید. این شرکت با تولید بیش از ۳۰۰ نوع دارو تحت لیسانس شرکت‌های معتبر بین‌المللی فعالیت داشت و در سال ۱۳۵۸ تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گرفت. در سال ۱۳۷۱ سهام آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خریداری شد و از سال ۱۳۷۷ با عنوان شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی خاص) به فعالیت مستقل خود ادامه داد.

## آلرگوتیک® (دس لوراتادین)

قرص روکشدار 5 میلی گرم

قبل از شروع مصرف دارو مطالب برگه راهنما را به دقت مطالعه کنید. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ بنابراین از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری فرمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفاً با پزشک معالج یا داروساز خود تماس حاصل فرمایید. در صورت تشدید عوارض جانبی و یا داشتن هر گونه عارضه جانبی که در این برگه راهنما ذکر نشده است، لطفاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

آنچه در این بروشور خواهید خواند:

1. قرص دس لوراتادین چیست و برای چه مواردی استفاده می‌شود
2. آنچه قبل از مصرف قرص دس لوراتادین باید بدانید
3. نحوه استفاده از قرص دس لوراتادین
4. عوارض جانبی احتمالی
5. نحوه نگهداری قرص دس لوراتادین

## 1. قرص دس لوراتادین چیست و چه کاربردی دارد؟

### 1.1. موارد مصرف درمانی

- واکنش آلرژیک و علائم آن
- رینیت آلرژیک
- تسکین علائم مرتبط با کهیر (یک بیماری پوستی ناشی از آلرژی)

## 2. آنچه قبل از مصرف قرص دس لوراتادین باید بدانید

### 2.1. موارد منع مصرف

- اگر به دس لوراتادین یا هر یک از ترکیبات دیگر این دارو حساسیت دارید، قرص دسلوراتادین مصرف نکنید.

### 2.2. اقدامات احتیاطی

- اگر موارد زیر را دارید، قبل از مصرف این قرص‌ها با پزشک خود مشورت کنید:
- سابقه پزشکی یا خانوادگی تشنج.
- عملکرد ضعیف کلیه.
- اختلال کبدی.

### سایر داروها و دس لوراتادین

در صورت مصرف داروهای دیگر، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. اثرات دارو ممکن است در صورت مصرف همزمان با سایر داروهای آرام‌بخش تشدید شود.

### اقدامات احتیاطی مرتبط با عوارض جانبی

واکنش‌های حساسیت (از جمله آنافیلاکسی) با مصرف این دارو گزارش شده است؛ در صورت بروز علائم/نشانه‌های حساسیت، فوراً درمان را قطع کنید.

### دس لوراتادین همراه با الکل

مصرف دس لوراتادین همراه با الکل باعث تشدید عوارض دارو می‌شود.

## ۲،۳ بارداری و شیردهی

دس لوراتادین در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود، مگر اینکه پزشک شما آن را به وضوح ضروری بدانند.

## 2.4. رانندگی و استفاده از ماشین آلات

دس لوراتادین در دوز توصیه شده، باعث خواب‌آلودگی یا کاهش هوشیاری شما نمی‌شود. با این حال، به ندرت برخی افراد خواب‌آلودگی را تجربه می‌کنند که ممکن است بر توانایی آنها در رانندگی یا استفاده از ماشین‌آلات تأثیر بگذارد.

## 2.5. تداخلات دارویی

در صورت مصرف هر یک از موارد زیر، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید:

- آزالستین (بینی)
- داروهای آنتی هیستامین
- بتاهیستین
- بوپرنورفین
- اکسی کدون
- رانولازین
- پرامی پکسول
- تالیدوماید
- زولپیدم

## 3. نحوه مصرف دس لوراتادین

### 1.3. دوز مصرف

#### رینیت آلرژیک

بزرگسالان و نوجوانان (۱۲ سال و بالاتر): یک قرص (5 میلی گرم)، یک بار در روز  
کودکان 6 تا 11 سال: 2/5 میلی گرم، یک بار در روز  
کودکان 12 ماه تا 5 سال: 1/25 میلی گرم، یک بار در روز  
کودکان 6 ماه تا 11 ماه: 1 میلی گرم، یک بار در روز

#### کهیر

بزرگسالان و نوجوانان (۱۲ سال و بالاتر): یک قرص (5 میلی گرم)، یک بار در روز  
کودکان 6 تا 11 سال: 2/5 میلی گرم، یک بار در روز  
کودکان 2 تا 5 سال: 1/25 میلی گرم، یک بار در روز

### 2.3. روش مصرف

این دارو را می توان با یا بدون غذا مصرف کرد. قرص ها را با یک لیوان آب ببلعید. آنها را نجوید.  
بدون مشورت با پزشک، دوز دارو را تغییر ندهید یا مصرف دارو را قطع نکنید.

### 3.3. مصرف بیش از حد

دز لوراتادین را فقط طبق دستور پزشک مصرف کنید. هیچ مشکل جدی در صورت مصرف بیش از حد تصادفی انتظار نمی رود. با این حال، اگر دز لوراتادین بیشتری از مقدار توصیه شده مصرف کردید، با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.

**4.3. اگر مصرف دس لوراتادین را فراموش کردید**  
برای جبران دوز فراموش شده، دوز دو برابر مصرف نکنید.

#### **4. عوارض جانبی احتمالی**

مانند همه داروها، این دارو نیز می تواند عوارض جانبی ایجاد کند، اگرچه همه افراد به آنها مبتلا نمی شوند.  
در بزرگسالان، خستگی، خشکی دهان و سردرد بیشتر گزارش شده است.  
در نوجوانان، سردرد شایع ترین عارضه جانبی گزارش شده بود.  
در صورت مشاهده هر یک از عوارض جانبی زیر، مصرف این دارو را متوقف کرده و با پزشک خود تماس بگیرید یا به نزدیکترین بیمارستان مراجعه کنید:

##### بسیار نادر

- واکنش های آلرژیک شدید مانند مشکل در تنفس، تنگی نفس، خس خس سینه، خارش، کهیر و تورم صورت، لب ها، زبان یا سایر قسمت های بدن و بثورات پوستی
- تشنج
- بیماری کبد (حالت تهوع، استفراغ، از دست دادن اشتها، احساس ناخوشی عمومی، تب، خارش، زرد شدن پوست و چشم ها، مدفوع روشن، ادرار تیره رنگ)

##### شایع

- خستگی
- خشکی دهان
- سردرد

#### **5. نحوه نگهداری دس لوراتادین**

این دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود. از نور و رطوبت محافظت شود.