

لوراتادین

قرص خط دار 10 میلی گرمی

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمائید.

الف – راهنماییهای عمومی:

1 – سابقه حساسیت به لوراتادین یا سایر آنتی هیستامین ها، همچنین حساسیت به مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگها.

2 – در صورت بارداری یا شیردهی.

3 – مصرف این دارو در کودکان و نیز افراد سالخورده ممکن است عوارض جانبی جدی به دنبال داشته باشد.

4 – در مورد مصرف هر نوع دارو چه با نسخه و چه بدون نسخه پزشک.

5 – در صورت ابتلاء به هر نوع بیماری بخصوص بیماری های بزرگ شدن غده پروستات، هر نوع مشکلات احتباس ادراری، گلوکوم (بیماری افزایش فشار چشم)، نارسایی کبدی، سابقه اشکال در ریتم قلب، کاهش پتاسیم خون.

در طول درمان با این دارو رعایت نکات زیر توصیه می گردد:

1– دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید. از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده یا به مدت طولانی بدون اجازه پزشک خودداری کنید.

2 – برای اثر بخشی بهتر، دارو را با معده خالی میل کنید.

3– اگر یک نوبت دارو فراموش شد، به محض یادآوری آن را مصرف کنید ولی چنانچه نزدیک به نوبت بعدی بود، ازمصرف آن خودداری کرده و نوبت بعدی را دوباربر نکنید.

ب – مصرف در حاملگی و شیردهی:

مصرف این دارو در بارداری و شیردهی غیر مجاز است مگر با تجویز پزشک متخصص.

پ – هشدارها:

1– قبل از انجام هرگونه آزمون پوستی برای آلرژی پزشک را از مصرف این دارو آگاه کنید.زیرا ممکن است در نتایج تست تأثیر گذارد.

2 – در بیمارانی که برای درمان روماتیسم یا التهاب مفاصل مقادیر زیادی آسپرین مصرف می کنند، استفاده همزمان داروی فوق و لوراتادین می تواند سبب مخفی شدن عوارض جانبی آسپرین مانند وزوز گوش شود.

3– این دارو سبب تشدید اثر سایر داروهای تضعیف کننده سیستم عصبی مرکزی مانند مسکن ها، آرام بخش ها یا داروهای خواب آور، مخدرها یا سایر داروهای ضد درد، باربی تورات ها، داروهای ضد تشنج، شل کننده های عضلانی و بیחס کننده ها (مانند بیחס کننده های موضعی دندان) می شود. لذا قبل از مصرف داروهای فوق، پزشک را از مصرف لوراتادین مطلع نمایید.

4 – مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی و کاهش هوشیاری شود. لذا در حین درمان از رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری کنید.

5– مصرف این دارو ممکن است سبب خشکی دهان، بینی و گلو شود. در این صورت می توانید از آبنبات و آدامس های بدون شکر یا تکه های کوچک یخ استفاده کنید. در صورتی که عارضه فوق بیش از دو هفته ادامه یافت، حتماً با پزشک یا دندانپزشک مراجعه کنید.

ت – مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف از فردی به فرد دیگر متفاوت است.

مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

• بزرگسالان و کودکان بالای 6 سال :

روزانه یکبار 10 میلی گرم.

• کودکان 5–2 سال

روزانه یک بار 5 میلی گرم.

ث – عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشوداگر چه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز عوارض جانبی زیر بلافاصله به پزشک اطلاع دهید:

گلودرد، خونریزی، خستگی یا ضعف غیرعادی، دردهای شکمی، ضربان قلب تند یا نامنظم، تب و لرز، مدفوع و ادرار تیره، سرفه، اسهال، اشکال در بلع، دانه های جلدی، کهیر، خارش، تشنج، ورم پلک، صورت، لب یا زبان، سرگیجه، خستگی و ضعف غیرمعمول.

سایر عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می روند به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارض جانبی زیر پزشک را مطلع کنید:

خواب آلودگی بیش از حد، خشکی دهان، بینی یا گلو، برگشت محتویات دستگاه گوارش به دهان و تهوع ،افزایش اشتها و درنتیجه افزایش وزن بدن، غلیظ شدن ترشحات مخاطی و سردرد.

ج – مسمومیت :

در صورت مصرف اتفاقی دارو بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار را به مرکز مسمومیت ها انتقال دهید.

علائم مصرف بیش از حد دارو عبارتند از:

عدم ثبات در انجام کارها، صرع(تشنج)، خواب آلودگی شدید، خشکی شدید دهان، بینی یا گلو، احساس غش، برافروختگی یا قرمزی صورت، توهم زایی(در دیدن، شنیدن یا احساس چیزهایی که وجود ندارند)، تنگی نفس یا هر گونه مشکل تنفسی، اختلالات خواب.

چ – شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از **30** درجه سانتیگراد، دور از حرارت، رطوبت و نور مستقیم نگهداری شود.

دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری گردد.

شرکت کارخانجات داروپخش

تهران – ایران



⁴ USPDI, Advice for the patient Drug information in lay language 2007 p:144-145

⁵ USPDI, Advice for the patient Drug information in lay language 2007 p:146-147

⁶ USPDI, Drug information for the health care professional 2007 p:338

⁷ USPDI, Advice for the patient Drug information in lay language 2007 p:146

¹ USPDI, Advice for the patient Drug information in lay language 2007 p:143

² USPDI, Advice for the patient Drug information in lay language 2007 p:143

³ USPDI, Advice for the patient Drug information in lay language 2007 p:146