

متوکار بامول

قرص 500 میلی گرمی

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمائید.

الف - راهنمایی های عمومی^۱:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

1 - سابقه هرگونه حساسیت به متوکاربامول و یا سایر داروهای شل کننده ماهیچه، میووبامات، همچنین حساسیت به مواد دیگر از قبیل غذاها، رنگها و مواد محافظ.

2 - در صورت بارداری یا شیردهی.

3 - در صورت مصرف هر نوع دارو چه با نسخه و چه بدون نسخه پزشک بخصوص داروهای تضعیف کننده سیستم عصبی مرکزی مانند آنتی هیستامین ها، بیحس کننده ها، ضد دردهای مخدر، آرامبخش ها، مسکن ها و خواب آورها و ضد افسردگیهای سه حلقه ای

4 - در صورت ابتلا به آلرژی یا سابقه آن، بیماری خونی ناشی از آلرژی یا ناشی از حساسیت به دارو و یا سابقه آن، سوء مصرف یا وابستگی به داروها بیماری کبدی، کلیوی، خونریزی زیر جلدی و تشنج.

(در طول مصرف این دارو در صورت وجود اشکال در بلع قرص، می توان آن را شکست و با مقداری غذا و یا آب مخلوط نمود.)

ب - مصرف در بارداری و شیردهی:^۲

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی غیرمجاز است، مگر در موارد اضطراری و به تشخیص پزشک متخصص.

پ - هشدارها:^۳

1 - این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی و سرگیجه شود، لذا در طول درمان با این دارو از رانندگی یا کار با آلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارد، خودداری کنید.

2 - در صورت مصرف طولانی مدت دارو برای بررسی پیشرفت درمان در فواصل زمانی منظم به پزشک مراجعه کنید.

3 - مصرف این دارو ممکن است سبب بروز تازی دید، عدم تعادل یا از دست دادن مهارت در انجام کار گردد.

4 - در صورت تغییر رنگ ادرار به سیاه، قهوه ای یا سبز، بلافاصله مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه کنید.

ت - مقدار و نحوه مصرف دارو :^۴

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است: بزرگسالان و بالغین: در ابتدا 1500 میلی گرم چهار مرتبه در روز. پس از احساس بهبودی مقدار مصرف دارو توسط پزشک کاهش می یابد .

کودکان: مقدار مصرف دارو در کودکان توسط پزشک تعیین می گردد.

در صورتیکه یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید، اگر تا یک ساعت به یاد آوردید آن را مصرف کنید. در غیر این صورت آنرا مصرف نکرده و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید.

ث - عوارض جانبی :^۵

هر دارو به موازات اثر مطلوب درمانی، ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز عوارض ذیل به پزشک اطلاع دهید:

غش، ضریان سریع قلب، تنگی نفس، اختلال در تنفس، احساس فشار در سینه و یا خس خس سینه، برافروختگی، قرمزی و خارش پوست، تب، قرمزی چشم ها، ورم کبیر مانند در ناحیه صورت، پلکها، دهان، لبها و یا زبان، افسردگی، گرفتگی بینی و احساس سوزش در چشمها.

سایر عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می روند، به هرحال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مانند: تازی دید، دوبینی یا هرگونه اختلال در بینایی، سرگیجه و خواب آلودگی به پزشک اطلاع دهید.

ج - مسمومیت:^۶

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، بیمار را به بیمارستان منتقل کنید.

چ - شرایط نگهداری :^۷

دارو در دمای کمتر از **30** درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود.

دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش
تهران - ایران



⁵ USPDI, Advice for the patient Drug information in lay language 2007 p:1472

⁶ USPDI, Drug information for the health care professional 2007 p:2626

⁷ USPDI, Advice for the patient Drug information in lay language 2007 p:1472

¹ USPDI, Advice for the patient Drug information in lay language 2007 p:1471

² USPDI, Advice for the patient Drug information in lay language 2007 p:1471

³ USPDI, Advice for the patient Drug information in lay language 2007 p:1472

⁴ USPDI, Advice for the patient Drug information in lay language 2007 p:1471