

## سیپرو هیتادین

قرص خط دار ۴ میلی گرم

100 عدد قرص خط دار در یک جعبه

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

### موارد مصرف

استفاده در شرایط آلرژیک مانند:

- تب یونجه، کهیر، خارش،
- رینیت آلرژیک چند ساله و فصلی،
- رینیت وازوموتور،
- ملتحمه آلرژیک ناشی از آلرژن های استنشاقی و غذاها،
- تظاهرات پوستی آلرژیک خفیف و بدون عارضه کهیر و آنژیوادم،
- بهبود واکنش های آلرژیک به خون یا پلاسما،
- درمان کمکی آنافیلاکتیک

سایر موارد کاربرد:

- افزایش اشتها
- سندرم سروتونین
- اسپاستیسیتة مرتبط با آسیب نخاع
- پیشگیری از میگرن اپیزودیک (در اطفال)

### راهنمایی های پیش از مصرف

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- اگر به سیپرو هیتادین یا هر جزء دیگر از این دارو حساسیت دارید.

- اگر به داروهایی مانند این دارو، غذا یا مواد دیگر حساسیت دارید. علائمی که تجربه کردید را با پزشک خود در میان بگذارید.

- اگر هر یک از این مشکلات سلامتی ذکر شده و یا هر بیماری زمینه ای دیگری دارید: انسداد روده، بزرگ شدن پروستات، گلوکوم، مشکل در دفع ادرار و زخم در معده یا روده.

- اگر در حال حاضر مصرف کننده ی هر داروی دیگری هستید یا در طول ۱۴ روز گذشته از داروهای ضد پارکینسون و یا ضد افسردگی مصرف کردید.

- اگر ۶۵ سال یا بیشتر دارید.

- اگر در حال شیردهی هستید. در طول مصرف این دارو از شیر دادن خودداری کنید.

### مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف دارو را بر اساس شرایط هر فرد پزشک مشخص میکند اما نحوه مصرف

این دارو به شرح ذیل است:

بزرگسالان

شرایط آلرژیک:

۴ میلی گرم ۳ بار در روز، دوز معمول ۴-۲۰ میلی گرم در روز. حداکثر دوز روزانه:

۳۲ میلی گرم در روز

افزایش اشتها:

۲ میلی گرم ۴ بار در روز به مدت یک هفته، سپس ۴ میلی گرم ۴ بار در روز

کودکان

۲ تا ۶ سال: ۲ میلی گرم هر ۸ تا ۱۲ ساعت. حداکثر دوز روزانه: ۱۲ میلی گرم در روز

۷ تا ۱۴ سال: ۴ میلی گرم هر ۸ تا ۱۲ ساعت. حداکثر دوز روزانه: ۱۶ میلی گرم در روز

### هشدارها

این دارو ممکن است باعث سرکوب CNS (سیستم اعصاب مرکزی) شود که ممکن است توانایی های جسمی یا ذهنی را مختل کند. فلذا بیماران باید در مورد انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری ذهنی دارند (مانند کار با ماشین آلات یا رانندگی) احتیاط کنند.

در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی عروقی، بیماران با افزایش فشار داخل چشم، بیماران مبتلا به آسم یا سایر اختلالات تنفسی مزمن، بیماران مبتلا به اختلال عملکرد تیروئید با احتیاط مصرف شود.

آنتی هیستامین ها بیشتر باعث سرگیجه، آرام بخشی و افت فشار خون در بیماران مسن می شوند.

آنتی هیستامین ها ممکن است در کودکان خردسال باعث تحریک شوند.

### مصرف در دوران بارداری و شیردهی

بارداری

مصرف این دارو بدون تجویز پزشک متخصص در دوران بارداری ممنوع است.

شیردهی

مصرف این دارو در در زمان شیردهی ممنوع است.

### موارد منع مصرف

- منع مصرف در نوزادان تازه متولد شده یا نارس یا مادران شیرده

- منع مصرف در صورت حساسیت به سیپرو هیتادین یا هر جزء دیگری از فرمولاسیون

- منع مصرف در صورت تحت درمان بودن با داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز(مانند سلؤلین، راساؤلین)

- منع مصرف در بیماران دارای گلوکوم زاویه بسته

- منع مصرف در بیماران دارای زخم معده

- منع مصرف در بیماران مبتلا به هیپرتروفی علامت دار پروستات

- منع مصرف در انسداد گردن مثانه

- منع مصرف در انسداد پیلورودئودنال

- منع مصرف در بیماران مسن و ناتوان

### تداخلات دارویی و غذایی

• مصرف همزمان این دارو و اسپری بینی آزلاستین دارای تداخل دارویی می باشد.(خطر رده X: از مصرف همزمان این دو دارو اجتناب کنید).

• مصرف همزمان این دارو و اسپری دهانی ایپراتروپیوم دارای تداخل دارویی می باشد.(خطر رده X: از مصرف همزمان این دو دارو اجتناب کنید).

• مصرف همزمان این دارو و کپسول استنشاقی تیوتروپیوم دارای تداخل دارویی می باشد.(خطر رده X: از مصرف همزمان این دو دارو اجتناب کنید).

• مصرف همزمان این دارو و داروی سلؤلین دارای تداخل دارویی می باشد.(خطر رده X: از مصرف همزمان این دو دارو اجتناب کنید).

• مصرف همزمان این دارو و داروهای پتاسیم سیتрат و پتاسیم کلراید دارای تداخل دارویی می باشد.(خطر رده X: از مصرف همزمان این دو دارو اجتناب کنید).

• مصرف همزمان این دارو و بوپرنورفین دارای تداخل دارویی می باشد. (خطر رده D: نیازمند اصلاح درمان)

• مصرف همزمان این دارو و زولپیدم دارای تداخل دارویی می باشد. (خطر رده D: نیازمند اصلاح درمان)

• مصرف همزمان این دارو و داروهای ضد درد اپیونیدی دارای تداخل دارویی می باشند.(خطر رده D: نیازمند اصلاح درمان)

• مصرف همزمان این دارو و اکسی کدون دارای تداخل دارویی می باشند. (خطر رده D: نیازمند اصلاح درمان)

• مصرف همزمان این دارو و فرآورده های حاوی الکل دارای تداخل دارویی می باشد. (خطر رده C: نیازمند نظارت بر درمان)

### عوارض جانبی

مصرف هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض جانبی و ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز مکرر و آزاردهنده هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

قلبی عروقی: افت فشار خون، تپش قلب، تاکی کاردی

سیستم عصبی مرکزی: آتاکسی، لرز، گیجی، سرگیجه، خواب آلودگی، سرخوشی، هیجان، خستگی، توهم، سردرد، اضطراب، بی خوابی، تحریک پذیری، عصبی بودن، نوریت، پارستزی، بی قراری، آرام بخشی، تشنج، سرگیجه.

درماتولوژیک: دیافورز، حساسیت به نور پوست، بثورات پوستی، کهیر

دستگاه گوارش: درد شکم، بی اشتها، افزایش اشتها، کلساز، یبوست، اسهال، تهوع، استفراغ، خشکی دهان.

ادراری تناسلی: مشکل در دفع ادرار، تکرر ادرار، احتباس ادرار

هماتولوژیک و انکولوژیک: آگرانولوسیتوز، کم خونی همولیتیک، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی

کبدی: نارسایی کبدی، هپاتیت، یرقان

حساسیت مفرط: شوک آنافیلاکتیک، آنژیوادم، واکنش حساسیت مفرط

عصبی عضلانی و اسکلتی: لرزش

چشمی: تاری دید، دوبینی

گوشی: لابیرونتیت (حاد)، وزوز گوش

تنفسی: احتقان بینی، فارنژیت، غلیظ شدن ترشحات برونش

### مسمومیت

در صورت مصرف تصادفی مقادیر زیاده از دوز تجویز شده، همراه دارو به مراکز درمانی مراجعه کنید.

### شرایط نگهداری :

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش



تهران - ایران