

دی پی فنادین® (فکسوفنادین)

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

• موارد مصرف

استفاده در رینیت آلرژیک فصلی در کودکان بالای ۲ سال و بزرگسالان استفاده در خارش های با منشا نامشخص

• راهنمایی های پیش از مصرف

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت حساسیت به فکسوفنادین یا هر یک از آنتی هیستامین ها
- در صورت ابتلا به نارسایی کلیوی و کبدی
- در صورت ابتلا به بیماری های مزمن قلبی و عروقی
- در دوران بارداری و شیردهی

• مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف دارو را بر اساس شرایط هر فرد پزشک مشخص میکند اما نحوه مصرف این دارو به شرح ذیل است:

بزرگسالان

شرایط آلرژیک:

۶۰ میلی گرم ۲ بار در روز قبل از غذا

۱۲۰-۱۸۰ میلی گرم یکبار در روز قبل از غذا

• هشدارها

- این دارو تاثیر چشم گیری بر روی CNS (سیستم اعصاب مرکزی) ندارد و افراد در حین مصرف فکسوفنادین هوشیاری لازم جهت کار با ماشین آلات یا رانندگی را دارند ولیکن به دلیل ماهیت فارماکودینامیکی محصول به جهت اطمینان از عوارض غیر معمول دارو در افراد حساس می بایست بررسی گردد.
- در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی عروقی با احتیاط مصرف شود بدلیل بروز عارضه تاکی کاردی و پالپیتیشن (احساس تپش قلب غیر عادی)

• مصرف در دوران بارداری و شیردهی

- مصرف این دارو بدون تجویز پزشک متخصص در دوران بارداری توصیه نمی شود.
- مصرف این دارو بدلیل ترشح در شیر مادر در زمان شیردهی توصیه نمی شود.

• موارد منع مصرف

- منع مصرف در صورت حساسیت به فکسوفنادین یا هر جزء دیگری از فرمولاسیون
- منع مصرف در بیماران مبتلا به بیماری های مزمن قلبی و عروقی
- منع مصرف در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی و کبدی
- منع مصرف در بیماران مسن و ناتوان

- منع مصرف همزمان با داروهای آزالستین، ایپراتروپیوم، تیوتروپیوم، پتاسیم سیتрат و پتاسیم کلراید

• تداخلات دارویی و غذایی

- مصرف همزمان این دارو و اسپری بینی آزالستین اجتناب کنید.
- مصرف همزمان این دارو و اسپری دهانی ایپراتروپیوم اجتناب کنید.
- مصرف همزمان این دارو و کپسول استنشاقی تیوتروپیوم اجتناب کنید.
- مصرف همزمان این دارو و داروهای پتاسیم سیترات و پتاسیم کلراید اجتناب کنید.
- مصرف همزمان این دارو با آنتی اسیدها به دلیل کاهش سطح فکسوفنادین توصیه نمی شود. رعایت فاصله زمانی چند ساعتی الزامی است.
- مصرف همزمان این دارو و بوپرنورفین و سایر ضد دردهای اپیوئیدی می تواند سبب افزایش اثر سرکوب سیستم عصبی شود و کاهش دوز این دسته دارویی با مشورت پزشک توصیه می شود.
- مصرف همزمان این دارو و زولپیدم می تواند سبب افزایش اثر سرکوب سیستم عصبی شود و کاهش دوز این دارو با مشورت پزشک توصیه می شود. از مصرف این دو دارو در زمان خواب بپرهیزید.
- مصرف همزمان این دارو و فرآورده های حاوی الکل دارای تداخل دارویی می باشد.

• عوارض جانبی

مصرف هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض جانبی و ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز مکرر و آزاردهنده هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید. قلبی عروقی: تپش قلب، تاکی کاردی سیستم عصبی مرکزی: سردرد، گیجی، سرگیجه، اضطراب، بی خوابی، تحریک پذیری، خستگی درماتولوژیک: بثورات پوستی، کهیر دستگاه گوارش: تهوع. ادراری تناسلی: مشکل در دفع ادرار، تکرر ادرار، احتباس ادرار چشمی: تاری دید

• مسمومیت

در صورت مصرف تصادفی مقادیر زیادتیر از دوز تجویز شده، همراه دارو به مراکز درمانی مراجعه کنید.

• شرایط نگهداری :

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید. دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید. از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش

تهران - ایران

