

مترونیدازول

سوسپانسیون خوراکی

۱۲۵ میلی گرم / ۵ میلی لیتر

موارد مصرف

عفونت های باکتریایی، عفونت های دستگاه گوارش، عفونت های شکمی، عفونت های تریکوموناسی واژینال، عفونت های پوستی

راهنمایی های پیش از مصرف

- پیش از مصرف این دارو در موارد زیر حتما با پزشک یا داروساز مشورت کنید:
- در صورت سابقه حساسیت به مترونیدازول یا داروهای مشابه
- در صورت ابتلا به بیماری های کبدی و کلیوی

نحوه مصرف

مقدار مصرف دارو را پزشک مشخص می کند.
دارو را سر ساعت مشخص مصرف نمایید و دوره درمان را کامل کنید.
فواصل مصرف بین هر دوز مصرفی ۸ ساعت است.
ماکزیمم دوز روزانه 2250 mg/day است.

هشدارها

- این احتمال وجود دارد که پس از از بین بردن تریکوموناس واژینالیس، عفونت گنوکوکی ادامه یابد.
- بر اساس مطالعات حیوانی احتمالا سرطان زا است لذا از مصرف بی مورد و بدون تجویز پزشک خودداری نمایید.
- اختلالات عصبی شدید که ممکن است پس از قطع مصرف دارو طی چند روز تا چند هفته قابل برگشت هستند. گاهی در مواردی تشدید تشنج نیز از این دارو دیده شده است لذا مصرف این دارو در بیماران دارای مشکلات سیستم عصبی باید با احتیاط همراه باشد.
- در بیماران مبتلا به انسفالوپاتی کبدی باید با احتیاط مصرف شود.
- در بیمارانی که سابقه در زمینه تغییر تعداد سلول های خونی دارند باید CBC قبل از شروع درمان و حین درمان اندازه گیری شود به ویژه در بیمارانی که بیشتر از ۱۰ روز باید این دارو را مصرف کنند.
- در بیمارانی که همودیالیز می شوند باید مترونیدازول بلافاصله پس از اتمام همو دیالیز مجددا تجویز شود.
- این دارو ممکن است ادرار را تیره کند.
- در صورت مشاهده زائده های فراوان پوستی و یا در ناحیه مخاطی دارو را قطع کرده و فوراً به پزشک مراجعه نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است و میتواند به جنین آسیب وارد کند.
مترونیدازول در شیر مادر ترشح می شود و در حین دوره درمان شیر مادر را تلخ می کند پس بهتر است در حین دوران درمان از شیردهی بپرهیزید.

موارد منع مصرف

- سابقه حساسیت به مترونیدازول
- سابقه هر نوع حساسیت جدی مانند اریتما، آنژیوادم، آسم و ...
- بروز علائم حساسیت به دارو (قرمزی و تورم صورت و لب ها یا زبان، دانه های پوستی خارش دار یا راش پوستی، تنگی نفس)
- سه ماهه اول بارداری همراه با تریکوموناس
- سابقه واکنش دی سولفیرام در طی دو هفته گذشته

تداخلات دارویی

- حین مصرف این دارو از مصرف فرآورده های حاوی الکل اکیدا خودداری کنید و بدنبال واکنش شبه دی سولفیرام سیستم عصبی مرکزی تحت تاثیر قرار می گیرد.
- مترونیدازول سبب کاهش اثر واکسن ب.ث.ژ می شود و در صورت تزریق واکسن از مصرف مترونیدازول خودداری نمایید.
- مصرف همزمان مترونیدازول و لیتیموم سبب افزایش سطح سرمی لیتیموم می شود و باید با تشخیص پزشک متخصص مصرف شوند.
- مصرف همزمان مترونیدازول و کاربا مازپین سبب افزایش سطح سرمی کاربامازپین و سمیت آن می شوند.

عوارض جانبی

مصرف هر دارو می تواند در کنار اثرات مفید، عوارض جانبی ایجاد کند که البته در همه افراد رخ نمی دهد.

در صورتیکه هر یک از عوارض زیر رخ داد با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:
تهوع، استفراغ، سردرد، التهاب ناحیه واژن، احساس طعم فلز در دهان، گیجی، درد شکمی، عفونت های باکتریایی، عفونت های ادراری، کاندیدیازیس، علائم شبه سرماخوردگی، عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی، التهاب سینوس ها.

مسمومیت

صرف بیش از اندازه این دارو خطرناک است به ویژه در مقادیر بیشتر از ۱۲ گرم ، لذا در صورت مصرف تصادفی بیش از مقادیر تجویز شده، سریعاً همراه با دارو به بیمارستان مراجعه کنید.

شرایط نگهداری :

دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

دارو را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور نگه داشته و از یخ

زدگی محافظت نمایید.

شرکت کارخانجات داروپخش



تهران - ایران

Reference: www.medicines.org.uk/emc

Uptodate/UpToDate.2.0.Revision.042018

www.accessdata.fda.gov/FDA label