

آسیکلوویر

قرص 200 و 400 میلی گرم

• موارد مصرف

- این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.
- از جمله موارد مصرف آسیکلوویر به شرح ذیل است:
- درمان آلودگی ویروسی هرپس (تبخال) در پوست و مخاط
- پیشگیری و سرکوب عفونت راجعه هرپس در بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی
- درمان بیماری های آبله مرغان و زونا

• مقدار مصرف

مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است :

در طول دوره درمان با این دارو مطمئن شوید بیمار آب و مایعات کافی دریافت می کند.

- درمان آلودگی ویروسی هرپس (تبخال):

بزرگسالان: مقدار 200 میلی گرم، 5 بار در روز (فاصله بین دو دوز 4 ساعت)، به مدت 10-5 روز

اولین دوز درمان در زودترین زمان پس از شروع آلودگی باید مصرف شود.

در کودکان 12-2 سال: مقدار مصرف توسط پزشک تعیین می شود.

- عفونت راجعه تبخال (تبخال) در بزرگسالان:

بزرگسالان: مقدار 200 میلی گرم، 4 بار در روز (فاصله بین دو دوز 6 ساعت)، یا 400 میلی گرم هر 12 ساعت

دوره درمان با توجه به شرایط بیمار می تواند بین 6-12 ماه ادامه یابد.

در کودکان 12-2 سال: مقدار مصرف توسط پزشک تعیین می شود.

- آبله مرغان و زونا:

بزرگسالان و کودکان بالای 2 سال: 800 میلی گرم 5 بار در روز (فاصله بین دو دوز 4 ساعت) به مدت 7 روز مصرف می شود.

برای کودکان مقدار مصرف توسط پزشک تعیین می شود.

اولین دوز درمان در زودترین زمان پس از مشاهده راش های پوستی باید مصرف شود.

• هشدار مصرف

- آسیکلوویر در بیماران با نارسایی کلیوی و یا افراد مسن که عملکرد کلیوی ضعیفی دارند باید تنظیم دوز شود. همچنین این بیماران در ریسک عوارض جانبی نوروژیک هستند که باید به صورت مداوم پایش شوند.
- هنگام مصرف دارو، جهت جلوگیری از بروز عوارض کلیوی، باید به مقدار کافی مایعات مصرف شود.
- مصرف طولانی مدت آسیکلوویر در بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی می تواند منجر به مقاومت ویروس در برابر آسیکلوویر شود و بیمار به درمان با آسیکلوویر پاسخ ندهد.

- مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای سمی برای کلیه ریسک نارسایی کلیوی را افزایش می دهد. لذا از مصرف همزمان این داروها خودداری نمایید.
- درمان با آسیکلوویر باید بلافاصله پس از مشاهده اولین علائم عفونت آغاز شود.

• مصرف در دوران بارداری و شیردهی

باتوجه به اینکه مطالعات کنترل شده ای در انسان در مورد مصرف این دارو انجام نشده است. لذا مصرف این دارو در دوران شیردهی و بارداری تحت نظر پزشک متخصص باشد.

• موارد منع مصرف

- حساسیت به ماده آسیکلوویر/والاسیکلوویر یا هر جزء دیگری از دارو
- مصرف همزمان با واکسن آبله مرغان یا زونا (واکسن واریسلا-واکسن زوستر)

• تداخل با سایر محصولات دارویی و سایر اشکال تداخل

- مصرف همزمان این دارو با سایر داروهایی که از مسیر کلیه دفع می شوند می تواند سبب افزایش غلظت پلاسمایی آسیکلوویر شود از جمله مصرف همزمان با داروی تنوفیلین که در زمان دوره درمان با آسیکلوویر سطح غلظت پلاسمایی داروی باید مورد پایش قرار گیرد.
- مصرف همزمان داروی آسیکلوویر با تزریق واکسن آبله مرغان یا زونا (واکسن واریسلا-واکسن زوستر) ممنوع است و مصرف داروی ضد ویروس باید 14 روز پس از واکسیناسیون مجاز است.

• عوارض جانبی

- هردارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز عوارض زیر پزشک را مطلع کنید:
- اختلالات کلیوی- تهوع- استفراغ- دهیدراسیون- دردهای شکمی-اختلالات گوارشی- راش پوستی- خستگی- تب
- بعضی عوارض به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می رود و نیاز به مراقبتهای پزشکی ندارد ازجمله :
- سردرد، سرگیجه، احساس کسالت و بییماری، برافروختگی.

• شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.
- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- ازنگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش
تهران - ایران



REFERENCES:

1. Medicines.org.uk/emc
2. Uptodate.com/2025