

# آزیترومایسین

250 و 500 میلی گرم

قرص روکشدار (6 و 60 عددی)

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

## موارد مصرف

از این دارو برای درمان عفونت های ناشی از باکتری های خاص و سایر میکروارگانیسم ها استفاده می شود که عبارتند از:

- عفونت های قفسه سینه، گلو یا بینی (مانند برونشیت، ذات الریه، التهاب لوزه، گلودرد و سینوزیت)
- عفونت گوش
- عفونت های پوست و بافت نرم (مانند آبسه یا کورک)
- بیماری های مقاربتی ناشی از ارگانیسم هایی به نام کلامیدیا تراکوماتیس و نایسریا گونوره.

## راهنمایی های پیش از مصرف

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- اگر به آزیترومایسین یا هر جزء دیگری از این دارو حساسیت دارید.
- اگر به هر دارو، غذا یا مواد دیگری حساسیت دارید. به پزشک خود در مورد آلرژی و علائمی که داشتید، اطلاع دهید.
- اگر هر یک از این مشکلات سلامتی را دارید: QT طولانی در نوار قلب، سطوح پایین منیزیم یا سطوح پایین پتاسیم.
- اگر ضربان قلب شما کند است.
- اگر قبلاً با این دارو دچار زردی پوست شده اید یا عوارض کبدی داشته اید.
- اگر از داروهایی استفاده می کنید که می تواند باعث ایجاد نوع خاصی از ضربان قلب غیر طبیعی شود (فاصله QT طولانی مدت). داروهای زیادی وجود دارند که می توانند این کار را انجام دهند. اگر مطمئن نیستید از پزشک یا داروساز خود بپرسید.

به پزشک و دارو ساز خود در مورد تمام **داروها** (نسخه ای یا OTC، محصولات طبیعی، ویتامین ها) و **بیماری** های خود اطلاع دهید. شما باید بررسی کنید تا مطمئن شوید که مصرف این دارو برای شما با تمام داروها و مشکلات سلامتی ای که دارید بی خطر است. بدون مشورت با پزشک، هیچ دارویی را شروع و قطع نکنید و یا تغییر ندهید.

## مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف دارو را بر اساس شرایط هر فرد پزشک مشخص میکنند اما نحوه مصرف

این دارو به شرح ذیل است:

کپسول آزیترومایسین را باید 1 ساعت قبل از غذا یا 2 ساعت بعد از غذا مصرف کنید.

## هشدارها

قبل از مصرف کپسول آزیترومایسین در صورت داشتن و یا سابقه ی یکی از شرایط زیر با پزشک یا داروساز خود صحبت کنید:

- مشکلات کلیوی
- مشکلات قلبی
- مشکلات کبدی
- میاستنی گراویس
- یا اگر از مشتقات ارگوت مانند ارگوتامین (که برای درمان میگرن استفاده می شود) استفاده می کنید زیرا این داروها نباید همراه با کپسول آزیترومایسین مصرف شوند.
- اگر هنگام مصرف کپسول آزیترومایسین احساس تپش قلب یا ضربان قلب غیرطبیعی داشتید یا دچار سرگیجه، غش و یا ضعف عضلانی شدید، فوراً به پزشک خود اطلاع دهید.
- اگر در طول یا بعد از درمان دچار اسهال یا مدفوع شل شدید، فوراً به پزشک خود اطلاع دهید.
- برای درمان اسهال خود بدون مشورت با پزشک خود هیچ دارویی مصرف نکنید.

## مصرف در دوران بارداری و شیردهی

اگر باردار و یا شیرده هستید، فکر می کنید ممکن است باردار باشید یا قصد بچه دار شدن دارید، قبل از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

## موارد منع مصرف

- در صورت حساسیت به آزیترومایسین و سایر آنتی بیوتیک های ماکرولید (مانند اریترومایسین و کلاریترومایسین) یا هر جزء دیگری از فرمولاسیون.
- در صورت سابقه زردی کلستاتیک و یا اختلال عملکرد کبد مرتبط با مصرف قبلی آزیترومایسین

## تداخلات دارویی و غذایی

برخی از داروها با یکدیگر تداخل دارند و این می تواند اثر آنها را تغییر دهد. در صورت مصرف داروهای زیر به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید:

- آمیودارون
- کلشی سین
- دابی گاتران
- دوکسوروبیسین
- هیدروکسی کلروکین
- میفه پریستون
- پیموزاید
- توپوتکان
- وین کریستین

## عوارض جانبی

اگر هر یک از علائم زیر را پس از مصرف این دارو تجربه کردید، فوراً به پزشک خود اطلاع دهید:

- خس خس ناگهانی، مشکل در تنفس، تورم پلک چشم، صورت یا لب ها، بثورات پوستی یا خارش (به ویژه در کل بدن)
- اسهال شدید یا طولانی مدت، که ممکن است دارای خون یا مخاط باشد (در طول یا بعد از درمان با کپسول آزیترومایسین). زیرا ممکن است نشانه التهاب جدی روده باشد.
- ضربان قلب سریع یا نامنظم
- فشار خون پایین
- واکنش های جدی پوستی مانند تاول در پوست، دهان، چشم و اندام تناسلی

در صورت بروز این علائم پوستی مصرف کپسول آزیترومایسین را متوقف کنید و فوراً با پزشک خود تماس بگیرید یا به پزشک مراجعه کنید.

شایع ترین عوارض جانبی که هنگام مصرف کپسول آزیترومایسین رخ می دهد در زیر ذکر شده است. اگر هر یک از این عوارض جانبی همچنان شما را آزار می دهد به پزشک خود اطلاع دهید.

- انقباضات و درد شکمی، تهوع، استفراغ، اسهال
- سرگیجه، سردرد
- بی اشتها
- اختلالات بینایی، شنوایی، چشایی
- بثورات پوستی و یا خارش
- خستگی یا ضعف

### مسمومیت

در صورت مصرف بیش از حد کپسول آزیترومایسین ممکن است احساس ناراحتی کنید. به پزشک خود اطلاع دهید یا فوراً به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کنید.

### شرایط نگهداری

در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.  
دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.  
از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش



تهران - ایران

---

#### REFERENCES:

UpToDate Website

Medicines.org.uk/emc