

توپیرامات

قرص توپیرامات ۲۵-۵۰-۱۰۰ میلی گرم

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

• موارد مصرف

خط اول درمان صرع تونیک کلونیک در کودکان بالای ۲ سال

مصرف در سایر انواع صرع

پیشگیری از سردردهای میگرنی در بیماران بالای ۱۲ سال

سایر موارد مصرف: وابستگی به الکل، افزایش وزن های ناشی از آنتی سایکوتیک ها و ...

• راهنمایی های پیش از مصرف

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت بارداری یا شیردهی

- در صورت سابقه ابتلا به بیماری های افسردگی

- در صورت ابتلا به نارسایی کلیوی و کبدی

• مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف دارو را بر اساس شرایط و مورد مصرف هر فرد توسط پزشک متخصص مشخص می شود.

شروع درمان با داروی توپیرامات باید با دوز کم شروع و به صورت پیوسته تا زمان حصول اثر درمانی افزایش یابد.

- ماکزیمم دوز مصرفی توپیرامات در بیماران مبتلا به صرع ۱۰۰۰ میلی گرم روزانه است.

- ماکزیمم دوز مصرفی توپیرامات در میگرن ۲۰۰ میلی گرم در روز است.

• هشدارها

- توپیرامات می تواند سبب بروز مشکلات شناختی از جمله گیجی، خستگی، عدم تمرکز، سختی در صحبت کردن، مشکلات حافظه، افسردگی و تغییر مود شود که ناشی از اثرات دوز بالا یا افزایش دوز ناگهانی است فلذا بیماران در حین مصرف داروی توپیرامات از رانندگی و کارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری کنید.

- در صورت مشاهده علائم خستگی مفرط، تهوع یا تغییر ذهنی نامشخص با پزشک خود مشورت نمایید. افزایش آمونیوم خون در مصرف تنها یا همراه با والهروئیک اسید توپیرامات به علت مقاومت به توپیرامات مشاهده شده است.

- بروز اسیدوز متابولیک در بیماران محتمل است فلذا پایش سطح سدیم بی کربنات باید به صورت مداوم ادامه داشته باشد. کاهش دوز یا قطع مصرف توپیرامات در شرایط اسیدوز متابولیک شدید توصیه می شود. در صورت ادامه درمان، مصرف مکمل های آلكالی پیشنهاد می شود.

- در کودکان افزایش دمای بدن و عدم تعریق مشاهده می شود فلذا در زمان فعالیت های شدید یا قرارگیری در هوای گرم دمای بدن کودکان باید پایش شود.

- توپیرامات می تواند سبب بروز مشکلات چشمی در بزرگسالان و کودکان به ویژه در ۱ ماهه اول شروع مصرف شود. در بیماران با کاهش حاد بینایی یا درد چشمی دارو می بایست قطع شود.

- مصرف توپیرامات در بیماران دارای رژیم کتوژنیک به علت بروز سنگ های کلیوی پرهیز شود. به علت ریسک بالای بروز سنگ های کلیوی در مصرف کنندگان مصرف بالای مایعات توصیه می شود.

- در بیماران با سابقه افسردگی و خودکشی داروی توپیرامات باید با احتیاط مصرف شود.

- در بیماران با سابقه کلیوی و کبدی داروی توپیرامات باید توسط پزشک تنظیم دوز شود.

• مصرف در دوران بارداری و شیردهی

مصرف توپیرامات و تشنج هر دو میتوانند آسیب زا برای زنان باردار و جنین آن ها داشته باشد.

در خانم هایی که قصد بارداری دارند قطع ناگهانی توپیرامات به علت ریسک بالای تشنج ممنوع است و می بایست تحت نظر پزشک متخصص و به آرامی جایگزینی با داروی دیگر صورت پذیرد.

مصرف توپیرامات در بارداری ممنوع است مگر در شرایطی که جایگزین مناسب برای آن وجود نداشته باشد.

مصرف توپیرامات به دلیل ترشح در شیر مادر می تواند سبب بروز عوارضی همچون اسهال، گیجی، و عدم وزن گیری مناسب نوزاد شود فلذا تصمیم به ادامه یا قطع شیردهی و قطع یا ادامه مصرف توپیرامات با تجویز پزشک متخصص است.

• موارد منع مصرف

در بیماران دارای شرایط زیر مصرف توپیرامات ممنوع است:

- حساسیت به توپیرامات

- در خانم های باردار یا خانم ها در سنین باروری

• تداخلات دارویی و غذایی

- مصرف همزمان سایر داروهای ضد صرع با توپیرامات می تواند سبب تغییر غلظت خونی توپیرامات شود بنابراین دو توپیرامات می بایست تنظیم شود.

غلظت توپیرامات	غلظت سایر داروی ضد صرع	مصرف توپیرامات با سایر داروها
↓	**↔	Phenytoin
↓	↔	Carbamazepine (CBZ)
↔	↔	Valproic acid
↔	↔	Lamotrigine
NS	↔	Phenobarbital
NS	↔	Primidone

- مصرف همزمان توپیرامات با فرآورده های حاوی الکل می تواند اثر سرکوب سیستم عصبی را تشدید کند.
- مصرف همزمان توپیرامات با داروهای ضدبارداری استروژنی می تواند سبب کاهش غلظت خونی داروی ضد بارداری شود به ویژه در دوزهای بالای ۲۰۰ میلی گرم در روز فلذا استفاده از روش غیر هورمونی جایگزین به عنوان روش موثر ضد بارداری توصیه می شود.

• عوارض جانبی

مصرف هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض جانبی و ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز مکرر و آزاردهنده هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

سیستم اعصاب مرکزی: گیجی، خستگی، مشکلات حافظه، گزگز دست و پا، عدم تمرکز، افسردگی، مشکلات شناختی، اضطراب، سردرد، مشکل در صحبت کردن

سیستم هورمونی و متابولیک: کاهش غلظت سرمی بی کربنات، کاهش وزن، افزایش غلظت خونی آمونیوم، مشکلات دوران قاعدگی

سیستم گوارشی: درد شکمی، تغییر طعم دهان، بی میلی به غذا، یبوست

پوست: کچلی، راش های پوست

بینایی: تاری دید، قرمزی چشم، اختلال بینایی

سیستم ادراری-تناسلی: عفونت مجاری ادراری، تکرر ادرار، کاهش لیبیدو، خونریزی واژینال

• مسمومیت

در صورت مصرف تصادفی مقادیر زیادتر از دوز تجویز شده، همراه دارو به مراکز درمانی مراجعه کنید.

• شرایط نگهداری

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید. دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید. از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش



تهران - ایران