

موارد مصرف

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

گاباپنتین جهت درمان دردهای نوروپاتیک محیطی و صرع، طبق نظر پزشک استفاده می شود.

راهنمایی های پیش از مصرف

پیش از مصرف این دارو در موارد زیر حتما با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

- در صورت سابقه هر نوع حساسیت به گاباپنتین یا داروهای مشابه
- در صورت بارداری و شیردهی
- در صورت مصرف هر نوع دارو ی دیگر
- در صورت ابتلا به بیماری های کلیوی
- سنین بالای ۶۵ سال
- در صورت ابتلا به هر بیماری مزمن و زمینه ای

مقدار و نحوه مصرف

مقدار و نحوه مصرف این دارو با توجه به شرایط بیمار و با تجویز پزشک صورت می گیرد. اما دوز معمول مصرف دارو به شرح زیر است:

دردهای نوروپاتیک

بزرگسالان ۳۰۰ میلی گرم سه بار در روز و سپس هر ۳-۲ روزانه افزایش روزانه ۳۰۰ میلی گرم تا ۳۶۰۰ میلی گرم روزانه (۱۲۰۰ میلی گرم ۳ بار در روز)

صرع

بزرگسالان: ۳۰۰ میلی گرم سه بار در روز و سپس هر ۳-۲ روزانه افزایش روزانه ۳۰۰ میلی گرم تا ۳۶۰۰ میلی گرم روزانه (۱۲۰۰ میلی گرم ۳ بار در روز)

کودکان ۶ سال به بالا: روزانه ۱۰ الی ۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و افزایش دوز دارو(هر ۳ روز) تا روزانه ۲۵ الی ۳۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

- در صورت فراموش نمودن یک نوبت مصرف، در صورتی که بیش از دو ساعت به زمان مصرف نوبت بعدی باقی مانده باشد، نوبت فراموش شده را مصرف نمایید. در غیر این صورت از دو برابر کردن نوبت بعدی خودداری فرمایید.

- دارو را طبق میزان تجویز شده توسط پزشک مصرف کنید. از تغییر مقدار مصرف دارو و یا تغییر در دفعات مصرف خودداری کنید.

- در افراد بالای ۶۵ سال در صورتی که به اختلال عملکرد کلیه دچار باشند، دوز دارو باید کاهش یابد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

مصرف این دارو در بارداری و شیریهی مجاز نیست مگر به صلاحدید پزشک متخصص

موارد منع مصرف

سابقه حساسیت یا بروز علائم حساسیت شدید (تورم و قرمز یصورت و لب ها ، دانه های قرمز خارش دار، تنگی نفس و تورم زبان)

تداخلات دارویی و غذایی

- مصرف همزمان این دارو با ایبوپروفن موجب افزایش احتمال ابتلا به عارضه وابستگی، سو مصرف و دپرسیون تنفسی می شود.
- آنتی اسیدها موجب کاهش فراهمی زیستی گاباپنتین می شوند.

هشدارها

مصرف این دارو ممکن است موجب گیجی و خواب آلودگی شود، لذا حین مصرف از رانندگی و انجام دادن کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند خودداری کنید.

مصرف این دارو ممکن است موجب وابستگی (اعتیاد) شود، لذا از مصرف و یا قطع

مصرف خودسرانه و بدون نظر پزشک جدا خودداری کنید. و در فواصل زمانی منظم

جهت کنترل نحوه و مقدار مصرف به پزشک مراجعه کنید.

عوارض جانبی

هر دارو در کنار اثرات مثبت می تواند عوارض جانبی داشته باشد که در همه افراد رخ نمی دهد، در صورتیکه هریک از عوارض به صورت مکرر یا آزاردهنده رخ داد به پزشک مراجعه کنید.

عوارض شایع: خواب آلودگی، خستگی، تاری دید، دوبینی، افسردگی، تحریک پذیری، تغییرات خلقی و روانی و کاهش حافظه، عفونت های ویروسی، عفونت های تنفسی و ادراری، لرزش، سردرد، حساسیت پوست به لمس، گلودرد، سرفه، خشکی بینی، استفراغ، تورم صورت، خارش، آکنه، درد شکم، اسهال، سو هاضمه، ضعف، کاهش تعداد گلبول های سفید، درد مفصل و غشله.

عوارض ناشایع: واکنش های حساسیتی، فشار خون بالا، بی قراری، سختی در بلع، اختلال در نتایج آزمایشهای کبدی، افسردگی، کاهش هوشیاری، کاهش قند خون

مسمومیت

علائم مسمومیت با دارو شامل اسهال، دو بینی، خواب آلودگی و کاهش هوشیاری می باشد. در صورت مصرف بیش از اندازه دارو بیمار را به همراه جعبه یا پلیستر دارو به مراکز درمانی انتقال دهید.

شرایط نگهداری :

دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

دارو را دور از حرارت، رطوبت و نور مستقیم و دردمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد و در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروبخش

تهران - ایران

