

شرکت کارخانجات داروپخش، بزرگترین و باسابقه‌ترین شرکت داروسازی کشور، در سال ۱۳۳۵ با همکاری شرکت انگلیسی Allen & Hanburys تأسیس شد و کارخانه آن در سال ۱۳۴۲ افتتاح گردید. این شرکت با تولید بیش از ۳۰۰ نوع دارو تحت لیسانس شرکت‌های معتبر بین‌المللی فعالیت داشت و در سال ۱۳۵۸ تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گرفت. در سال ۱۳۷۱ سهام آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خریداری شد و از سال ۱۳۷۷ با عنوان شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی خاص) به فعالیت مستقل خود ادامه داد.

فنی توئین 1٪

کرم 30 گرمی

قبل از شروع مصرف دارو مطالب برگه راهنما را به دقت مطالعه کنید. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ بنابراین از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری فرمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفاً با پزشک معالج یا داروساز خود تماس حاصل فرمایید. در صورت تشدید عوارض جانبی و یا داشتن هر گونه عارضه جانبی که در این برگه راهنما ذکر نشده است، لطفاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

آنچه در این بروشور خواهید خواند:

1. کرم فنی توئین چیست و برای چه مواردی استفاده می‌شود
2. آنچه قبل از مصرف کرم فنی توئین باید بدانید
3. نحوه استفاده از کرم فنی توئین
4. عوارض جانبی احتمالی
5. نحوه نگهداری کرم فنی توئین

1. کرم فنی توئین چیست و چه کاربردی دارد؟

1.1. موارد مصرف درمانی

کرم موضعی فنی توئین ۱٪ درمان کمکی برای مدیریت زخم‌های مزمن از جمله زخم بستر، زخم‌های ناشی از عفونت‌های میکوباکتریایی و زخم مرتبط با دیابت، به ویژه زخم پای دیابتی (که علیرغم مداخلات استاندارد، بهبودی با تأخیر دارند)، اپیدرمولیز بولوزا (بیماری پروانه ای) و بیماری‌های التهابی می‌باشد. به نظر می‌رسد فنی توئین در درمان اپیدرمولیز بولوزای دیستروفیک موثر نباشد. فنی توئین موضعی جذب سیستمیک کمی دارد و در کل تحمل موضعی خوبی دارد.

2. آنچه قبل از مصرف کرم فنی توئین باید بدانید

2.1. موارد منع مصرف

در صورت بروز حساسیت یا واکنش‌های آلرژیک زیر، مصرف کرم را متوقف کرده و با پزشک مشورت کنید: حساسیت پوستی: سوزش یا التهاب شدید در محل استفاده. واکنش آلرژیک نادر: تورم یا کهیر

2.2. اقدامات احتیاطی

استفاده از کرم فنی توئین می‌تواند به‌طور مؤثری در درمان بسیاری از زخم‌ها مؤثر باشد، اما در برخی از موارد، درمان به‌تنهایی با این کرم ممکن است کافی نباشد. به‌ویژه در زخم‌هایی که عمیق هستند یا علائم عفونت در آنها مشاهده می‌شود، ممکن است به درمان‌های پزشکی دیگر نیاز باشد. همیشه قبل از استفاده از کرم، دست‌ها را به‌خوبی بشویید. کرم باید به‌طور موضعی و تنها روی زخم‌های تمیز استفاده شود. از تماس کرم با چشم‌ها و غشاهای مخاطی خودداری کنید. برای بیماران دیابتی، کنترل قند خون در کنار مصرف این کرم اهمیت زیادی دارد.

2.3. بارداری و شیردهی

اگر باردار یا شیرده هستید، قبل از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

2.4. رانندگی و استفاده از ماشین آلات

جذب سیستمیک این دارو در استعمال موضعی بسیار کم می‌باشد. این دارو هیچ تأثیر خاصی بر رانندگی و استفاده از ماشین‌آلات وجود ندارد.

2.5. تداخلات دارویی

مصرف موضعی کرم فنی توئین تداخل قابل اهمیتی با سایر داروها ندارد.

3. نحوه مصرف فنی توئین

همیشه این دارو را دقیقاً طبق دستور پزشک مصرف کنید.

بنابراین، بیماران می‌توانند کرم فنی توئین را صبح و عصر، و در صورت نیاز ظهر نیز استفاده کنند تا پوشش درمانی در تمام طول روز حفظ شود. برای درمان زخم‌ها با استفاده از کرم فنی توئین، باید ابتدا زخم تمیز و خشک شود. سپس مقدار مناسبی از کرم روی زخم قرار داده شود و به آرامی ماساژ داده شود تا کرم به‌طور کامل جذب شود. بسته به نوع و شدت زخم، ممکن است بهبودی در عرض چند روز تا چند هفته مشاهده شود.

4. عوارض جانبی احتمالی

احتمال بروز عارضه جانبی سیستمیک (عمومی) با مصرف فنی توئین به صورت موضعی بسیار پایین است. در حقیقت سطح پلاسمایی فنی توئین پایین تر از حد ایجاد عارضه بوده است. با این حال عوارض جانبی پوستی آلرژیک، تکثیری و ایدیوسنکراتیک با استفاده از آن گزارش شده است. این عوارض جانبی موضعی گذرا بوده و پس از قطع درمان برطرف می شوند.

حساسیت پوستی: خارش، قرمزی، سوزش یا التهاب در محل استفاده.

تحریک موضعی: احساس گرما یا سوزش خفیف در ناحیه زخم.

واکنش آلرژیک نادر: در برخی افراد ممکنه تورم یا کهیر ایجاد شود.

خشکی یا پوسته ریزی پوست اطراف زخم: اگر به مقدار زیاد و طولانی استفاده شود.

5. نحوه نگهداری فنی توئین

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

دارو را در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.