

## ریواستیگمین

## کپسول 1/5 و 3 میلی گرمی

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری فرمایید. مصرف این دارو تنها با نظر پزشک مجاز می باشد .

### 1- کپسول ریواستیگمین چیست و چه کاربردی دارد؟

ریواستیگمین به دسته مهارکننده‌های کولین استراز تعلق دارد. این دارو به کاهش علائم در بیماران بزرگسال مبتلا به زوال عقل آلزایمر یا زوال عقل ناشی از بیماری پارکینسون کمک می‌کند. توجه : سلامتی و اثربخشی مصرف این دارو در کودکان ثابت نشده است .

### 2- آنچه قبل از مصرف کپسول ریواستیگمین باید بدانید

#### 2.1- موارد منع مصرف

اگر به ریواستیگمین یا هر یک از ترکیبات دیگر این دارو حساسیت دارید اگر قبلاً واکنش پوستی و درماتیت تماسی آلرژیک با ریواستیگمین داشته‌اید

#### 2.2- اقدامات احتیاطی

- در صورت داشتن مشکلات ذیل قبل از مصرف ریواستیگمین با پزشک خود مشورت کنید:
  - سابقه بیماری‌های قلبی عروقی مانند ضربان قلب نامنظم یا آهسته، طولانی شدن فاصله QT، تورساد دو پوینت یا سطح پایین پتاسیم یا منیزیم در خون
  - واکنش‌های گوارشی مانند زخم معده، حالت تهوع، استفراغ و اسهال
  - اختلال در دفع ادرار
  - سابقه تشنج و صرع
  - سابقه آسم یا بیماری تنفسی شدید
  - اختلال عملکرد کبد و کلیه
  - لرزش، ترمور و وزن بدن کم
- کنترل های دوره ای و منظم عملکرد شناختی بیماران (برای ارزیابی اثرات درمانی ریواستیگمین) و معاینات گوارشی (جهت بررسی علائم خونریزی های گوارشی و همچنین سایر عوارض نظیر تهوع، استفراغ، کم اشتهایی و کاهش وزن) در بیماران ضروری است .
- در صورت لزوم انواع جراحی یا درمان اورژانسی بیمار باید پزشک معالج و یا دندان پزشک خود را از مصرف این دارو آگاه نمایند.
- ممکن است به علت افزایش کلیرانس این دارو ناشی از نیکوتین در بیماران سیگاری، تغییر دوز دارو لازم باشد .

#### 2.3-بارداری و شیردهی

این دارو تنها در حالتی در بارداری مجاز است که مورد مصرف آن کاملاً مشهود باشد .

در طول درمان با ریواستیگمین نباید به نوزاد شیر دهید.

#### 2.4-رانندگی و استفاده از ماشین آلات

ریواستیگمین ممکن است باعث سرگیجه و خواب‌آلودگی، مخصوصاً در شروع درمان یا هنگام افزایش دوز شود. در این صورت از رانندگی و یا استفاده از ماشین آلات خودداری کنید.

#### 2.5- تداخلات دارویی

اگر داروی دیگری مصرف می‌کنید، اخیراً مصرف کرده‌اید یا ممکن است مصرف کنید، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

– ریواستیگمین نباید همزمان با سایر داروهایی با اثرات مشابه ریواستیگمین تجویز شود.

– ریواستیگمین نباید همزمان با متوکلوپرامید تجویز شود. مصرف همزمان این دو دارو می‌تواند باعث مشکلاتی مانند سفتی اندام‌ها و لرزش دست‌ها شود.

– مصرف هم زمان این دارو با داروهای آنتی کولینرژیک (ممکن است باعث کاهش اثرات این داروها و یا ریواستیگمین شود)، داروهای کولینومیمتیک نظیر بتانکول و مهار کننده های کولین استراز نظیر نتوستیگمین (ممکن است باعث افزایش اثر این داروها و ریواستیگمین و همچنین عوارض بالقوه این داروها شود)، داروهای مسدود کننده عصبی عضلانی که بوسیله کولین استراز متابولیزه می شوند نظیر سوکسینیل کولین و میواکوریوم (ریواستیگمین باعث افزایش مدت و شدت اثر شل کنندگی عضلانی این داروها می شود)وداروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی نظیر آسپرین (ریواستیگمین باعث تشدید سوزش و مشکلات گوارشی این داروها می شود ) دارای تداخل دارویی می باشد.

– اگر در حین مصرف ریواستیگمین مجبور به انجام عمل جراحی هستید، باید قبل از تجویز هرگونه داروی بیهوشی به پزشک خود اطلاع دهید، زیرا ریواستیگمین ممکن است اثرات برخی از شل‌کننده‌های عضلانی را در طول بیهوشی تشدید کند.

– می‌بایست در مصرف همزمان ریواستیگمین با داروهای مرتبط با بیماری‌های قلبی عروقی احتیاط گردد.

– احتیاط در مصرف همزمان ریواستیگمین با بتا بلاکرها (آنتولول). مصرف همزمان این دو دارو می‌تواند باعث مشکلاتی مانند کند شدن ضربان قلب (برادی کاردی) شود که منجر به غش یا از دست دادن هوشیاری می‌شود.

### 3- نحوه مصرف کپسول ریواستیگمین

#### 3.1-دوز مصرف

درمان معمولاً با دوز پایین شروع می‌شود. پزشک شما بسته به نحوه پاسخ شما به درمان، دوز را به آرامی افزایش می‌دهد.

پزشک شما همچنین در حین مصرف این دارو، وزن شما را کنترل خواهد کرد.

این دارو را دقیقاً مطابق شیوه ای که پزشکتان دستور داده استفاده فرمایید. مقدار تجویز معمول این دارو به قرار زیر است:

دوز بزرگسالان: در درمان خفیف تا متوسط زوال عقلی (دمانس) ناشی از بیماری الزایمر با دوز اولیه 1/5 میلی گرم 2 بار در روز آغاز می‌شود . ( لازم به ذکر است دوز آغازین در بیماران دارای سابقه حساسیت به اثرات داروهای کولینرژیک، 1 میلی گرم دوبار در روز می‌باشد). سپس در صورت تحمل دوز اولیه توسط بیمار به مدت حداقل دو هفته، دوز مصرفی به 3 میلی گرم دو بار در روز افزایش پیدا می‌کند و در صورت نیاز و تحمل بیمار در مراحل بعد و با توجه به فواصل حداقل دو هفته ، دوز مصرفی به 4/5 تا 6 میلی گرم دو بار در روز افزایش پیدا می‌کند.

توجه: حداکثر دوز روزانه 6 میلی‌گرم دو بار در روز (12 میلی گرم در روز) می‌باشد.

توجه : در صورت وقفه افتادن طولانی در مصرف این دارو، برای شروع مجدد درمان رعایت موارد ذکر شده برای دوز اولیه درمانی و تنظیم تدریجی دوز مصرفی ، ضروری است . توجه : سلامتی و اثربخشی مصرف این دارو در کودکان ثابت نشده است .

#### 3.2-روش مصرف

به بیماران توصیه می‌شود این دارو را در دو دوز منقسم صبح و شب بعد از صرف غذا مصرف نمایند و به منظور اثر بخشی بهتر ، دارو را هر روز سر ساعت معینی میل نمایند. کپسول‌ها را به طور کامل با یک نوشیدنی ببلعید. کپسول‌ها را باز یا خرد نکنید.

#### 3.3-مصرف بیش از حد

هرگز دارو را بیش از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف نکنید. زیرا احتمال بروز عوارض جانبی افزایش می یابد.

#### 3.4- اگر مصرف ریواستیگمین را فراموش کردید

در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یادآوردن آن را مصرف کنید. اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است ، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید .

اگر بیش از سه روز است که ریواستیگمین مصرف نکرده‌اید، دوز بعدی را تا زمانی که با پزشک خود مشورت نکرده‌اید، مصرف نکنید.

### 4- عوارض جانبی احتمالی

به طور کلی تمام داروها به موازات اثرات درمانی، دارای برخی عوارض ناخواسته هستند. اگر چه همیشه و تمام عوارض ذکر شده برای این دارو رخ نخواهد داد، لیکن در صورت بروز هر یک از آنها، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. این عوارض عبارتند از :

1- عوارضی که نیاز به مراقبت های پزشکی دارند :

شایع: عوارض گوارشی به ویژه بی اشتهایی، سوء هاضمه، تهوع، اسهال و استفراغ.

شیوع کم: اثرات قلبی عروقی به ویژه کاهش ضربان قلبی ، کاهش فشار خون و سنکوپ .

نادر: ضعف و فقدان نیرو، تشنج، تغییرات خلقی به ویژه پرخاشگری، حالت عصبی، لرزش دست‌ها و انگشت‌ها، انسداد مجاری ادراری و اختلال ادراری

2- عوارضی که تنها در صورت ادامه یافتن نیاز به مراقبت های پزشکی دارند:

شایع: دردهای شکمی، اختلال در تعادل، بیوست، نفخ، سردرد، گیجی، افسردگی، احساس خستگی و توهم.

شیوع کم: اشکال در خوابیدن، احساس کسالت و بی قراری، افزایش تعریق، رینیت و آبریزش .

### 5- نحوه نگهداری

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

دارو را در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد و در بسته بندی اصلی ، دور از نور و رطوبت نگهداری فرمایید .

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.



شرکت کارخانجات داروپخش

تهران –ایران