

شرکت کارخانجات داروپخش، بزرگترین و با سابقه‌ترین شرکت داروسازی کشور، در سال ۱۳۳۵ با همکاری شرکت انگلیسی Allen & Hanburys تأسیس شد و کارخانه آن در سال ۱۳۴۲ افتتاح گردید. این شرکت با تولید بیش از ۳۰۰ نوع دارو تحت لیسانس شرکت‌های معتبر بین‌المللی فعالیت داشت و در سال ۱۳۵۸ تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گرفت. در سال ۱۳۷۱ سهام آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خریداری شد و از سال ۱۳۷۷ با عنوان شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی خاص) به فعالیت مستقل خود ادامه داد.

آلوپورینول

قرص 100 میلی گرم

قرص 300 میلی گرم

قبل از شروع مصرف دارو مطالب برگه راهنما را به دقت مطالعه کنید. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ بنابراین از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری فرمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفاً با پزشک معالج یا داروساز خود تماس حاصل فرمایید. در صورت تشدید عوارض جانبی و یا داشتن هر گونه عارضه جانبی که در این برگه راهنما ذکر نشده است، لطفاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

آنچه در این بروشور خواهید خواند:

1. قرص آلوپورینول چیست و برای چه مواردی استفاده می‌شود
2. آنچه قبل از مصرف قرص آلوپورینول باید بدانید
3. نحوه استفاده از قرص آلوپورینول
4. عوارض جانبی احتمالی
5. نحوه نگهداری قرص آلوپورینول

1. قرص آلپورینول چیست و چه کاربردی دارد؟

1.1. موارد مصرف درمانی

- کاهش یا پیشگیری از تشکیل رسوبات اورات/اسید اوریک در شرایطی که بدن شما بیش از حد اسید اوریک تولید می‌کند. این شرایط ممکن است شامل نقرس، برخی انواع سنگ‌های کلیه (مانند سنگ‌های کلسیم اگزالات)، درمان سرطان (هایپراوریسمی ناشی از درمان سرطان) یا سایر موارد باشد.
- درمان برخی اختلالات آنزیمی، به‌ویژه سندرم لش-نیهان (Lesch-Nyhan syndrome).

2. آنچه قبل از مصرف قرص آلپورینول باید بدانید

1.2. موارد منع مصرف

اگر به آلپورینول یا هر یک از ترکیبات دیگر این دارو حساسیت دارید، از مصرف قرص‌های آلپورینول خودداری کنید.

2.2. اقدامات احتیاطی

- پیش از مصرف این دارو، در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید اگر:
- سابقه پزشکی یا خانوادگی تشنج دارید.
 - دچار اختلال عملکرد کلیه و/یا کبد هستید.
 - مشکلات قلبی یا فشار خون بالا دارید.
 - داروهای ادرارآور (دیورتیک) و/یا مهارکننده‌های ACE مصرف می‌کنید.
 - در حال حاضر دچار حمله نقرس هستید.
 - مشکلات تیروئید دارید.

در مصرف قرص‌های آلپورینول به نکات زیر توجه ویژه داشته باشید:

- بثورات پوستی شدید (مانند سندرم حساسیت مفرط، سندرم استیونز-جانسون و نکرولیز سمی اپیدرم) در بیماران مصرف‌کننده آلپورینول گزارش شده است. اغلب، این بثورات ممکن است با زخم‌هایی در دهان، گلو، بینی و اندام تناسلی و همچنین التهاب ملتحمه (قرمزی و تورم چشم‌ها) همراه باشد. این بثورات پوستی شدید اغلب با علائمی شبیه آنفولانزا (تب، سردرد و بدن‌درد) آغاز می‌شوند.
- اگر مبتلا به سرطان یا سندرم لش-نیهان هستید، ممکن است سطح اسید اوریک در ادرار شما افزایش یابد. برای پیشگیری از این وضعیت، باید مایعات کافی بنوشید تا ادرار شما رقیق شود.
- در صورت داشتن سنگ کلیه، با مصرف این دارو سنگ‌ها کوچک‌تر شده و ممکن است وارد مجاری ادراری شوند.
- مصرف این دارو در کودکان به‌ندرت تجویز می‌شود، مگر در موارد خاصی از سرطان (به‌ویژه لوسمی) و برخی اختلالات آنزیمی مانند سندرم لش-نیهان.

3.2. بارداری و شیردهی

آلوپورینول در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود، مگر اینکه پزشک شما آن را به وضوح ضروری بداند.

4.2. رانندگی و استفاده از ماشین آلات

ممکن است احساس خواب‌آلودگی یا سرگیجه کنید یا در هماهنگی حرکات بدن دچار مشکل شوید. در صورت بروز این علائم، رانندگی نکنید و با هیچ‌گونه ابزار یا ماشینی کار نکنید.

5.2. تداخلات دارویی

پیش از مصرف این قرص‌ها، اگر داروی دیگری مصرف می‌کنید، پزشک یا داروساز خود را مطلع سازید؛ به‌ویژه در مورد داروهای زیر:

خطر سطح C: پایش درمان

- تتوفیلین
- داروهای ضد تشنج (صرع)، مانند فنی‌توئین
- آنتی‌بیوتیک‌ها (آمی‌سیلین یا آموکسی‌سیلین)
- هرگونه داروی دیگر برای درمان نقرس، مانند پروبنسید

خطر سطح D: بررسی تغییر در روند درمان

آنتی‌اسیدها: ممکن است جذب آلوپورینول را کاهش دهند. باید حداقل ۳ ساعت فاصله زمانی بین مصرف این دو دارو رعایت شود. استثنا: سدیم بی‌کربنات

آزاتیوپرین: آلوپورینول ممکن است غلظت سرمی متابولیت‌های (فعال آزاتیوپرین را افزایش دهد. مهارکننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE Inhibitors): ممکن است احتمال بروز واکنش‌های آلرژیک یا حساسیت مفرط به آلوپورینول را افزایش دهند.

مرکاپتوپورین: آلوپورینول ممکن است غلظت سرمی مرکاپتوپورین را افزایش دهد. آنتاگونیست‌های ویتامین K (مانند وارفارین): آلوپورینول ممکن است اثر ضد انعقادی آنتاگونیست‌های ویتامین K را تشدید کند.

خطر سطح X: پرهیز از مصرف همزمان

تگافور (Tegafur): آلوپورینول ممکن است اثر درمانی تگافور را کاهش دهد.

3. نحوه مصرف آلوپورینول

1.3. دوز مصرف

نقرس

مقدار اولیه: ۱۰۰ میلی‌گرم یک‌بار در روز؛ در صورت نیاز، برای دستیابی به سطح مطلوب اسید اوریک سرم، دوز دارو را با فواصل هفتگی به میزان ۱۰۰ میلی‌گرم در روز افزایش دهید. محدوده دوز معمول: ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌گرم در روز برای موارد خفیف نقرس؛ ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلی‌گرم در روز برای موارد متوسط تا شدید نقرس

حداکثر دوز روزانه: ۸۰۰ میلی گرم.

هایپراوریسمی (سطح بالای اسید اوریک) ناشی از درمان سرطان
۶۰۰ تا ۸۰۰ میلی گرم روزانه در دوزهای منقسم، به مدت محدود ۲ تا ۳ روز پیش از شیمی درمانی.

سنگ های کلسیم اگزالات (عودکننده)
۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی گرم روزانه به صورت تک دوز یا دوزهای منقسم

سالمندان و افراد با نقص کبد و کلیه
اگر سالمند هستید یا دچار کاهش عملکرد کبد یا کلیه می باشید، ممکن است پزشک دوز کمتری تجویز کند یا فواصل مصرف دارو را طولانی تر در نظر بگیرد. اگر دو یا سه بار در هفته دیالیز می شوید، ممکن است پزشک دوز ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلی گرم را تجویز کند که باید بلافاصله پس از دیالیز مصرف شود.

کودکان
هایپراوریسمی ناشی از درمان سرطان:
کودکان زیر ۶ سال: ۱۵۰ میلی گرم روزانه
کودکان ۶ تا ۱۰ سال: ۳۰۰ میلی گرم روزانه
کودکان بالای ۱۰ سال: به دستورالعمل دوز بزرگسالان مراجعه شود.
نکته: دوز دارو را پس از ۴۸ ساعت در صورت لزوم تنظیم کنید.

2.3 روش مصرف

قرص را پس از صرف غذا و همراه با یک لیوان آب ببلعید. از جویدن قرص خودداری کنید. بدون مشورت با پزشک، دوز دارو را تغییر ندهید و مصرف آن را قطع نکنید.

3.3 مصرف بیش از حد

اگر بیش از مقدار تجویز شده آلپورینول مصرف کردید، با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید. علائم مصرف بیش از حد ممکن است شامل تهوع، استفراغ، اسهال و سرگیجه باشد.

4.3 اگر مصرف آلپورینول را فراموش کردید

اگر مصرف یک نوبت دارو را فراموش کردید، به محض به خاطر آوردن آن را مصرف کنید. با این حال، اگر به زمان نوبت بعدی نزدیک هستید، نوبت فراموش شده را نادیده بگیرید. برای جبران نوبت فراموش شده، هرگز دوز دارو را دو برابر نکنید.

4. عوارض جانبی احتمالی

این دارو نیز مانند تمام داروها ممکن است باعث بروز عوارض جانبی شود، هرچند این عوارض در همه افراد بروز نمی‌کند.

عوارض جانبی بسیار شایع:

پوستی: بثورات پوستی

غدد درون‌ریز و متابولیک: نقرس (حاد)

گوارشی: اسهال، تهوع

کبدی: افزایش آنزیم‌های کبدی، افزایش سطح سرمی آلکالین فسفاتاز

5. نحوه نگهداری آلوپورینول

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود. در برابر نور و رطوبت محافظت گردد.