

قطره چشمی بریمونیدین 0/2 درصد

- در صورت مشاهده واکنش‌های آلرژیک، درمان با باید قطع شود.

- در بیماران مبتلا به افسردگی، نارسایی مغزی یا کرونری، پدیده رینود، افت فشار خون وضعیتی یا ترومبوآنژییت انسدادی با احتیاط مصرف شود.

- در بیماران مبتلا به اختلال کبدی یا کلیوی با احتیاط مصرف شود.

- در بیماران مبتلا به خشکی چشم و در بیمارانی که ممکن است قرنیه آنها در معرض خطر باشد، با احتیاط مصرف شود.

- در صورت داشتن هرگونه بیماری زمینه ای چشمی، قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنید.

- در صورت استفاده طولانی مدت، بیماران باید تحت نظر باشند.

- مصرف این دارو ممکن است سبب گیجی، منگی، خستگی و یا کاهش هوشیاری شود. لذا در حین درمان با این دارو هنگام استفاده و یا کار با ماشین آلات و لوازمی که نیاز به هوشیاری کامل دارند و یا رانندگی، از سطح هوشیاری خود اطمینان حاصل کنید.

• مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران شیردهی و بارداری، با تشخیص پزشک معالج مجاز میباشد.

• نحوه مصرف:

پیش از مصرف دارو دستهای خود را با آب بشویید و بطری را به خوبی تکان دهید.

1. سر خود را به عقب خم کنید و به سقف نگاه کنید.
 2. پلک پایین را به آرامی پایین بکشید تا یک حفره کوچک ایجاد شود.
 3. بطری را وارونه کنید و به آرامی آن را فشار دهید تا 1 یا 2 قطره در چشم آزاد شود. از برخورد نوک قطره چکان با سطح چشم یا سایر اشیا خودداری نمایید.
 4. پلک پایین را رها کنید و چشم خود را به مدت 30 ثانیه بدون پلک زدن ببندید. گوشه داخلی چشم را فشار دهید. این کار را به مدت 1 تا 2 دقیقه انجام دهید. این کار دارو را در چشم شما نگه می‌دارد.
 5. اگر چشم دیگر نیز نیاز به درمان دارد، مراحل 2 تا 4 را برای چشم دیگر تکرار کنید.
- قبل از استفاده از این دارو، لنزهای تماسی را خارج کنید. لنزها را می‌توان ظرف ۱۵ دقیقه پس از مصرف دارو دوباره در چشم قرار داد. اگر چشمان شما تحریک یا عفونی شده است، دوباره لنزها را در چشم قرار ندهید.

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

• دسته دارویی :

سمپاتومیمیتیک‌ها در درمان گلوکوم

• مکانیسم اثر:

بریمونیدین یک آگونیست انتخابی گیرنده آدرنرژیک آلفا-۲ است.

• موارد مصرف:

کاهش فشار داخل چشمی بالا، در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز یا فشار خون بالای چشمی.

• موارد منع مصرف:

- در بیمارانی که قبلاً واکنش نامطلوب مشکوک به بنزالکونیوم کلراید داشته‌اند که منجر به قطع مصرف شده است.

- در افرادی که به بریمونیدین حساسیت دارند.

- نوزادان و کودکان (کمتر از ۲ سال)

- بیمارانی که مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز (MAO) و داروهای ضد افسردگی که بر انتقال نورآدرنژیک تأثیر می‌گذارند (مانند داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای) مصرف می‌کنند.

• هشدارها:

- کودکان بالای ۲ سال (به ویژه کودکان ۲ تا ۷ سال و کودکانی که وزن آنها کمتر یا مساوی ۲۰ کیلوگرم است) به دلیل میزان بالای خواب‌آلودگی، با احتیاط مصرف و به دقت تحت نظر باشند.

- در بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی شدید یا کنترل نشده باید با احتیاط مصرف شود.

- این محصول حاوی بنزالکونیوم کلراید است و ممکن است جذب شده و باعث تحریک موضعی خفیف و تغییر رنگ لنزهای تماسی نرم شود؛ قبل از تجویز، لنزها را خارج کرده و ۱۵ دقیقه قبل از قرار دادن مجدد صبر کنید.

در نوزادان و کودکانی که بریمونیدین دریافت می کنند گزارش شده است.

• نگهداری:

در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد، نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت شود.

30 روز پس از باز کردن درپوش ظرف، باقیمانده دارو را دور بریزید.

دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.



شرکت کارخانجات داروپخش
تهران - ایران

- اگر بیش از یک دارو در یک چشم استفاده می شود، هر دارو را حداقل 5 دقیقه با فاصله استفاده کنید.



• مقدار مصرف :

- یک قطره، هر 12 ساعت، در چشم چکانده شود.

• تداخلات دارویی:

- در بیمارانی که تحت درمان با مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (MAO) هستند و بیمارانی که داروهای ضد افسردگی که بر انتقال نورآدرناژیک تأثیر می گذارند (مانند داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای) مصرف می کنند، منع مصرف دارد.

- داروهای سرکوب کننده سیستم عصبی مرکزی (الکل، باریتورات ها، مواد افیونی، آرام بخش ها یا بی حس کننده ها).

- داروهایی که می توانند بر متابولیسم و جذب آمین ها در گردش خون تأثیر بگذارند، مانند کلرپرومازین، متیل فنیدات، رزپین.

- داروهایی مانند داروهای ضد فشار خون و گلیکوزیدهای قلبی.

- آگونیست ها یا آنتاگونیست های گیرنده آدرنرژیک (مانند ایزوپرنالین، پرازوسین).

• عوارض جانبی:

- اختلالات سیستم عصبی: سردرد، سرگیجه

- اختلالات چشمی: پرخونی چشم، سوزش و

خارش، احساس جسم خارجی در چشم، تاری دید

و واکنش آلرژیک چشمی، ورم چشم، ترشح

ملتحمه، درد چشم، اشک ریزش، فوتوفوبیا و

خشکی چشم.

- علائم تنفسی فوقانی

- اختلالات گوارشی: خشکی دهان و علائم گوارشی.

- اختلالات عمومی: خستگی و خواب آلودگی.

- علائم مصرف بیش از حد بریمونیدین مانند از دست

دادن هوشیاری، بی حالی، خواب آلودگی، افت فشار

خون، افت تون عضلانی، برادی کاردی، افت دمای

بدن، سیانوز، رنگ پریدگی، دپرسیون تنفسی و آپنه