

قطره چشمی تیمولول 0/5 درصد

- در مصرف کنندگان لنزهای تماسی .

• هشدارها:

- این محصول حاوی بنزالکونیوم کلراید است و ممکن است جذب شده و باعث تحریک موضعی خفیف و تغییر رنگ لنزهای تماسی نرم شود؛ قبل از تجویز، لنزها را خارج کرده و ۱۵ دقیقه قبل از قرار دادن مجدد صبر کنید.

- از تماس نوک قطره چشمی با چشم و سطوح مختلف خودداری کنید.

- در بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی، درمان با بتابلاکرها باید به طور دقیق ارزیابی شود و از نظر علائم وخامت این بیماری‌ها و واکنش‌های جانبی تحت نظر باشند.

- تیمولول ممکن است اثرات آگونیست‌های بتا سیستمیک مانند اپی نفرین (آدرنالین) را کاهش دهد. هنگام دریافت تیمولول توسط بیمار، باید به متخصص بیهوشی اطلاع داده شود.

• مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران شیردهی و بارداری، فقط با تشخیص پزشک معالج مجاز می‌باشد.

• نحوه مصرف:

پیش از مصرف دارو دست‌های خود را با آب بشویید و بطری را به خوبی تکان دهید.

1. سر خود را به عقب خم کنید و به سقف نگاه کنید.
2. پلک پایین را به آرامی پایین بکشید تا یک حفره کوچک ایجاد شود.
3. بطری را وارونه کنید و به آرامی آن را فشار دهید تا 1 یا 2 قطره در چشم آزاد شود. از برخورد نوک قطره چکان با سطح چشم یا سایر اشیا خودداری نمایید.
4. پلک پایین را رها کنید و چشم خود را به مدت 30 ثانیه بدون پلک زدن ببندید. گوشه داخلی چشم را فشار دهید. این کار را به مدت 1 تا 2 دقیقه انجام دهید. این کار دارو را در چشم شما نگه می‌دارد.
5. اگر چشم دیگر نیز نیاز به درمان دارد، مراحل 2 تا 4 را برای چشم دیگر تکرار کنید.

- قبل از استفاده از این دارو، لنزهای تماسی را خارج کنید. لنزها را می‌توان ظرف ۱۵ دقیقه پس از مصرف دارو دوباره در چشم قرار داد. اگر چشمان شما تحریک یا عفونی شده است، دوباره لنزها را در چشم قرار ندهید.

- اگر بیش از یک دارو در یک چشم استفاده می‌شود، هر دارو را حداقل ۵ دقیقه با فاصله استفاده کنید.



این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

• دسته دارویی :

داروهای ضد گلوکوم ، بتابلاکر غیر انتخابی

• مکانیسم اثر:

تیمولول به طور برگشت پذیر با گیرنده بتا-آدرنژیک ترکیب می‌شود و این امر پاسخ بیولوژیکی معمول را که با تحریک آن گیرنده رخ می‌دهد، مهار می‌کند.

• موارد مصرف:

- کاهش فشار داخل چشم بالا در بیماران مبتلا به فشار خون بالای چشمی، بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز مزمن و برخی از بیماران مبتلا به گلوکوم ثانویه.

• موارد منع مصرف:

- در بیمارانی که قبلاً واکنش نامطلوب مشکوک به بنزالکونیوم کلراید داشته‌اند که منجر به قطع مصرف شده است.

- در افرادی که به تیمولول حساسیت دارند.

- بیماری واکنشی راه هوایی شامل آسم برونشیال، بیماری انسدادی مزمن ریوی شدید.

- برادیکاردی سینوسی، بلوک سینوسی-دهلیزی، بلوک دهلیزی-طنبی درجه دو یا سه کنترل نشده

• موارد احتیاط مصرف:

- بیماران مبتلا به بلاک قلبی درجه 1.
- بیماران مبتلا به اختلالات شدید گردش خون محیطی مانند سندرم رینود
- بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD) خفیف یا متوسط
- بیمارانی که دچار افت خود به خودی قند خون یا بیماران مبتلا به دیابت ناپایدار
- بیماران مبتلا به بیماری‌های قرنیه مانند خشکی چشم
- به دلیل احتمال آپنه و علائم تنفسی، این دارو باید با احتیاط شدید در نوزادان، شیرخواران و کودکان خردسال استفاده شود.

- اختلالات اسکلتی-عضلانی و بافت همبند:

میالژی، آرتراژی

• مقدار مصرف :

حداکثر دوز روزانه هر 12 ساعت دو قطره در هر چشم می باشد.

✓ بیماران، به ویژه نوزادان، باید پس از اولین دوز به مدت یک تا دو ساعت در مطب از نظر عوارض جانبی چشمی و سیستمیک به دقت تحت نظر باشند.

• نگهداری:

در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد، درون جعبه نگهداری و از یخ زدگی محافظت گردد.

30 روز پس از باز کردن درپوش ظرف، باقیمانده دارو را دور بریزید.

دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

• تداخلات دارویی:

- مسدودکننده‌های کانال کلسیم خوراکی، داروهای مسدودکننده‌ی بتا آدرنرژیک، داروهای ضد آریتمی (از جمله آمیودارون)، گلیکوزیدهای دیژیتال، پاراسمپاتومیمتیک‌ها، گوانتیدین، احتمال بروز اثرات افزایشی و در نتیجه افت فشار خون و/یا برادی‌کاردی شدید وجود دارد.

- اثر بتابلاکر سیستمیک تقویت‌شده (مانند کاهش ضربان قلب، افسردگی) در طول درمان ترکیبی با مهارکننده‌های CYP2D6 (مانند کینیدین، فلوکستین، پاروکستین) و تیمولول گزارش شده است.

• عوارض جانبی:

در صورت مشاهده هر یک از علائم زیر به پزشک خود اطلاع دهید:

- اختلالات چشمی: تحریک چشم (مانند سوزش، گزش، خارش، اشک ریزش، قرمزی)، ورم ملتحمه، بلفاریت، کراتیت، خشکی چشم، کاهش حساسیت قرنیه، تاری دید، فرسایش قرنیه.

- اختلالات قلبی: برادی‌کاردی، درد قفسه سینه، آریتمی، بلوک قلبی، نارسایی احتقانی قلب، تپش قلب، ایست قلبی، نارسایی قلبی، ادم.

- اختلالات تنفسی: برونکواسپاسم، نارسایی تنفسی، تنگی نفس، سرفه.

- اختلالات پوستی و بافت زیر جلدی: آلورپیسی، بشورات پسوریازیس یا تشدید پسوریازیس، بشورات پوستی

- اختلالات عمومی: ضعف، خستگی

- واکنش‌های آلرژیک از جمله آنافیلاکسی، آنژیوادم، کهیر، بشورات موضعی و عمومی، واکنش آنافیلاکتیک.

شرکت کارخانجات داروپخش
تهران - ایران

