

شرکت کارخانجات داروپخش، بزرگترین و باسابقه‌ترین شرکت داروسازی کشور، در سال ۱۳۳۵ با همکاری شرکت انگلیسی Allen & Hanburys تأسیس شد و کارخانه آن در سال ۱۳۴۲ افتتاح گردید. این شرکت با تولید بیش از ۳۰۰ نوع دارو تحت لیسانس شرکت‌های معتبر بین‌المللی فعالیت داشت و در سال ۱۳۵۸ تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گرفت. در سال ۱۳۷۱ سهام آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خریداری شد و از سال ۱۳۷۷ با عنوان شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی خاص) به فعالیت مستقل خود ادامه داد.

دیلتیازم

60 میلی گرم

قرص روکشدار خط دار

قبل از شروع مصرف دارو مطالب برگه راهنما را به دقت مطالعه کنید. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ بنابراین از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری فرمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفاً با پزشک معالج یا داروساز خود تماس حاصل فرمایید. در صورت تشدید عوارض جانبی و یا داشتن هر گونه عارضه جانبی که در این برگه راهنما ذکر نشده است، لطفاً با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

آنچه در این بروشور خواهید خواند:

1. قرص دیلتیازم چیست و برای چه مواردی استفاده می‌شود
2. آنچه قبل از مصرف قرص دیلتیازم باید بدانید
3. نحوه استفاده از قرص دیلتیازم
4. عوارض جانبی احتمالی
5. نحوه نگهداری قرص دیلتیازم

1. قرص ديلتيازوم چيست و چه کاربردى دارد؟

1.1. موارد مصرف درمانى

- پايين آورنده فشار خون
- درمان آنژين صدرى و آريتمى
- قرص ديلتيازوم بلوك كننده كانال كلسيمى مى باشد.

2. آنچه قبل از مصرف قرص ديلتيازوم بايد بدانيد

2.1. موارد منع مصرف

اگر به ديلتيازوم يا هر يك از تركيبات ديگر اين دارو حساسيت داريد، قبل از مصرف اين دارو با پزشك خود مشورت كنيد. در صورت ابتلا به بلوك دهليزى-بطنى (AV block) درجه دو يا سه (به جز در بيماران داراي ضربان ساز مصنوعى فعال)؛ افت فشار خون (فشار سيستولى کمتر از ۹۰ ميلي متر جيوه)؛ انفاركتوس حاد ميكو كارد و احتقان ريوى.

2.2. اقدامات احتياطى

- قبل از مصرف ديلتيازوم با پزشك يا داروساز خود مشورت كنيد اگر:
- در صورت داشتن حساسيت به ديلتيازوم و ساير داروها.
- در صورت باردارى و شيردهى.
- در صورت ابتلاء به بيمارى هاى نظير بيماريهائى كبدى - كليوى، سابقه افسردگى، پاركينسون، نارساى قلبى (CHF)، آريتمى قلبى و يا ساير بيمارى هاى قلبى - عروقى.
- در صورت مصرف هر نوع دارو مصرفى با نسخه و بدون نسخه
- در صورت مصرف قطره هاى چشمى بتاكسولول و تيمولول.
- دارو را طبق دستور پزشك مصرف و دوره درمان را كامل كنيد. مصرف دارو را حتى اگر احساس بهبودى مى كنيد، ادامه دهيد.
- اين دارو را به طور همزمان با مكمل هاى كلسيم و منيزيم مصرف نكنيد.
- دارو را بيش از مقدار توصيه شده مصرف نكنيد.
- پزشك ممكن است به بيمارنى كه از اين دارو براى كنترل پرفشارى خون استفاده مى كنند، كنترل وزن و رژيم غذايى كم نمك را توصيه نمايد.
- به ياد داشته باشيد كه اين دارو پر فشارى خون را درمان نمى كند، بلكه به كنترل آن كمك مى كند و ممكن است مصرف آن براى تمام عمر ضرورت داشته باشد.
- به منظور بررسى پيشرفت درمان، به طور منظم به پزشك مراجعه كنيد.
- در صورت بروز سردرد شديد يا مداوم به پزشك مراجعه كنيد.
- با شروع درمان ممكن است سردرد عارض گردد. معمولاً با ادامه درمان اين عارضه از بين مى رود در صورت تداوم يا تشديد سردرد با پزشك خود تماس بگيريد.
- در مورد ميزان فعاليت هاى بدنى خود با پزشك مشورت كنيد.

۲.۳ بارداری و شیردهی

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی غیر مجاز است مگر در موارد اضطراری و با تشخیص پزشک متخصص. بنابراین اگر باردار یا شیرده هستید، فکر می‌کنید ممکن است باردار باشید یا قصد بچه‌دار شدن دارید، قبل از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

2.4. تداخلات دارویی

قرص دیلتیازم با بسیاری از داروها تداخل مصرف دارد. در صورت مصرف دیلتیازم، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. از جمله این داروها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- داروها با تداخلات رده C:

مسدودکننده‌های گیرنده آلفا-۱ (مانند ترازوسین و پرازوسین)، آمیودارون، آملودیپین، داروهای ضدروان‌پریشی (نسل دوم) (مانند کلروپرومازین، فلوپنازین، هالوپریدول، آلانزاپین، کلوزاپین، ریسپریدون، آریپیپرازول)، آپیکسابان، آسپرین، فنوباربیتال، مسدودکننده‌های گیرنده بتا (مانند آتنولول، متوپرولول، پروپرانولول)، بوسپیرون، گلیکوزیدهای قلبی (مانند دیگوکسین)، کلونیدین، کلپیدوگر، کورتیکواستروئیدها (مانند دگزامتازون)، دولوکستین، لوودوپا، لیتیم، اریترومايسين، کلاریترومايسين، اکسی‌کودون، پنتوکسی‌فیلین، رگورافییب، سالمترول، ساریلوماب، سیلدنافیل، تاکرولیموس، تامسولوسین، تیکاگرلور

- داروها با تداخلات رده D:

گل‌راعی یا علف چای (St John's Wort)، داروهای ضدقارچ (مشتقات آزول مانند فلوکونازول)، آتورواستاتین، کاربامازپین، کلشی سین، دابرافنیب، داپوکستین، اپلرنون، هیدروکسی‌زین، فنی‌توئین، رانولازین

- داروها با تداخلات رده X:

آپریپیتانت، بودزونايد، کوبیمتینیب، دومپریدون، پیموزاید

3. نحوه استفاده از قرص دیلتیازم

1.3. دوز مصرف

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌کند، ولی دوز توصیه شده در درمان آنژین به شرح زیر است:
- در بزرگسالان و نوجوانان: نصف قرص چهار بار در روز (قبل از غذا و هنگام خواب) به تدریج در صورت نیاز و تحمل مقدار مصرف را در فواصل یک یا دو روزه تا رسیدن به پاسخ مناسب بیمار می‌توان افزایش داد. پاسخ مناسب بیمار با مصرف 3 تا 6 قرص در روز حاصل می‌شود.
 - در کودکان: مقدار مصرف این دارو توسط پزشک تعیین می‌گردد.

2.3. روش مصرف

قرص‌ها باید با یک لیوان آب بلعیده شوند. این دارو به طور معمول قبل از غذا مصرف می‌شود.

4.3. اگر مصرف دیلتیازم را فراموش کردید

به محض اینکه به یاد آوردید، دوز فراموش شده را مصرف کنید. ولی در صورتیکه نزدیک به زمان مصرف دوز بعدی است، دوز فراموش شده را نادیده بگیرید و به زمان مصرف عادی خود برگردید. برای جبران دوز فراموش شده، دوز دو برابر مصرف نکنید.

3.5. مصرف بیش از حد

در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد تعیین شده و در صورتیکه مدت زیادی از خوردن دارو نگذشته باشد بیمار را وادار به استفراغ نموده و سریعاً به بیمارستان مسمومین منتقل نمائید.

4. عوارض جانبی احتمالی

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هریک از عوارض زیر با پزشک مشورت شود:

- شایع ترین عوارض شامل سردرد، سرگیجه، ادم محیطی، اختلال در تنفس، سرفه یا خس خس سینه، تهوع، یبوست، گرگرفتگی
- مهمترین عوارض شامل آریتمی قلب، کند (کمتر از 50 بار در دقیقه) و یا تند شدن ضربان قلب، نارسایی قلبی، بلوک AV
- عوارض نادر خواب آلودگی، بی خوابی، ضعف، اختلالات روانی، پارسستی (وزوز کردن گوش)، افت فشار خون، وضعیت غیر طبیعی ECG، سنکوپ، درماتیت، کهیر و خارش، سرخ شدن پوست بدن، حساسیت به نور، اسهال، دل پیچه، استفراغ، خشکی دهان
- **در صورت بروز بی نظمی ضربان قلب کوتاه شدن نفسها، تورم دستها و پاها سرگیجه شدید، یبوست، تهوع یا پایین بودن فشار خون فوراً با پزشک تماس بگیرید.**

سایر عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می رود. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عارضه، خستگی یا ضعف غیر عادی پزشک خود را مطلع نمائید.

5. نحوه نگهداری دیلتیازم

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
دارو را در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.