

کارودیلول

قرص روکشدار 6.25 و 12.5 میلی گرم

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

موارد مصرف

- کارودیلول متعلق به گروهی از داروها به نام بتابلاکرها است که در درمان موارد زیر به کار می رود:
- نارسایی احتقانی قلب.
- فشار خون بالا.
- آنژین صدری (درد یا ناراحتی در قفسه سینه زمانی که قلب شما اکسیژن کافی دریافت نمی کند)
- اختلال عملکرد بطن چپ به دنبال انفارکتوس میوکارد (MI)

راهنمایی های پیش از مصرف

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

اگر به کارودیلول و یا هر جزء دیگری از این دارو حساسیت دارید.

اگر به هر دارو، غذا یا مواد دیگر حساسیت دارید. به پزشک خود در مورد آلرژی و علائمی که تجربه کردید، مانند راش؛ خارش؛ تنگی نفس؛ خس خس سینه؛ سرفه؛ تورم صورت، لب ها، زبان یا گلو؛ و یا هر نشانه دیگری اطلاع دهید.

اگر هر یک از این مشکلات سلامتی را دارید پیش از مصرف این دارو با پزشک خود مشورت کنید: آسم، سایر مشکلات ریوی یا تنفسی که باعث تنگی نفس یا خس خس سینه می‌شود، ضربان قلب غیرطبیعی، نارسایی قلبی، بیماری کبدی، بیماری کلیوی.

به پزشک و داروساز خود در مورد تمام داروها (نسخه ای یا OTC، محصولات طبیعی، ویتامین ها) و بیماری های خود بگویید. شما باید بررسی کنید تا مطمئن شوید که مصرف این دارو برای شما با تمام داروها و مشکلات سلامتی شما بی خطر است. بدون مشورت با پزشک، هیچ دارویی را شروع و قطع نکنید و یا تغییر ندهید.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف دارو را بر اساس شرایط هر فرد پزشک مشخص میکند اما نحوه مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

نارسایی احتقانی قلب

• قرص های خود را باید همراه با غذا مصرف کنید.

- دوز شروع معمول 3.125 میلی گرم (نصف قرص 6.25 میلی گرم) دو بار در روز به مدت دو هفته است. سپس پزشک دوز را به آرامی و طی چندین هفته ، تا 25 میلی گرم دو بار در روز افزایش می دهد.
- اگر وزن شما بیش از 85 کیلوگرم (187 پوند) باشد، ممکن است دوز مصرف تا 50 میلی گرم دو بار در روز افزایش یابد.
- اگر بیش از دو هفته مصرف کارودیلول را قطع کرده اید برای مصرف مجدد باید به پزشک خود مراجعه کنید.

فشار خون بالا

- دوز شروع معمول 12.5 میلی گرم یک بار در روز برای دو روز اول است.
- پس از دو روز دوز معمولاً 25 میلی گرم، یک بار در روز است.
- اگر فشار خون شما تحت کنترل نباشد، پزشک ممکن است دوز را به آرامی، طی چند هفته تا 50 میلی گرم در روز افزایش دهد.
- اگر مسن هستید، ممکن است به بیش از 12.5 میلی گرم در روز برای کنترل فشار خون نیاز نداشته باشید.
- کارودیلول برای کودکان و نوجوانان زیر سن 18 سال مناسب نمی باشد.

هشدارها

• در صورت سابقه واکنش آنافیلاکسی شدید به آلرژن ها احتیاط کنید. بیمارانی که از بتابلاکرها استفاده می کنند ممکن است به چالش های مکرر حساس تر شوند. درمان آنافیلاکسی (به عنوان مثال، اپی نفرین) در بیمارانی که از بتابلاکرها استفاده می کنند ممکن است بی اثر باشد و یا باعث ایجاد عوارض نامطلوب شود.

•برادی کاردی ممکن است رخ دهد. اگر ضربان قلب به کمتر از 55 ضربه در دقیقه کاهش یابد، پزشک باید دوز را کاهش دهد.

• سندرم فلاپی عنبیه حین عمل در بیماران جراحی آب مروارید که قبلاً تحت درمان با آلفا بلاکرها بوده اند، مشاهده شده است. به نظر می رسد که هیچ فایده ای در قطع درمان با آلفا بلاکر قبل از جراحی وجود ندارد. به بیماران آموزش دهید که هنگام بررسی جراحی چشم، چشم پزشک را از مصرف کارودیلول مطلع کنند.

- افت فشار خون علامت دار با و یا بدون سنکوپ ممکن است با مصرف کارودیلول (معمولاً در 30 روز اول درمان) رخ دهد. نظارت دقیق بیمار به خصوص با شروع دوز اولیه و افزایش دوز الزامی است.
- در بیماران مشکوک به آنژین نوع پرینزمثال با احتیاط مصرف شود.
- به طور کلی، بیماران مبتلا به بیماری اسپاسم برونش نباید بتا بلاکرها را دریافت کنند. در صورت استفاده، باید با احتیاط و با نظارت دقیق استفاده شود.

• در بیماران دیابتی با احتیاط مصرف شود. ممکن است هیپوگلیسمی را تشدید کند و/یا علائم و نشانه های آن را بپوشاند (مانند تعریق، اضطراب، تاکی کاردی). در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و دیابت،

استفاده از کارودیلول ممکن است هیپرگلیسمی را بدتر کند وممکن است نیاز به تنظیم داروهای ضد دیابت داشته باشد.

- در بیماران با نارسایی خفیف تا متوسط کبدی با احتیاط مصرف شود. مصرف در بیماران مبتلا به نارسایی شدید کبدی منع مصرف دارد.
- در بیماران مبتلا به میاستنی گراویس با احتیاط مصرف شود.
- مصرف این دارو ممکن است علائم نارسایی شریانی را در بیماران مبتلا به بیماری عروق محیطی (PVD) تسریع یا تشدید کند.در صورت مصرف این دارو احتیاط کنید و برای پیشرفت انسداد شریانی تحت نظر پزشک خود باشید.
- در صورت فتوکروموسیتوم (درمان نشده) این دارو با احتیاط مصرف شود. (قبل از استفاده از هر بتا بلوکر ی باید آلفا بلوک کافی شروع شود).
- استفاده از بتابلوکرها با القا یا تشدید پورسیرایزس همراه بوده است، اما علت و معلول به طور قطعی ثابت نشده است.
- مصرف کارودیلول ممکن است علائم پرکاری تیروئید (مانند تاکی کاردی) را پنهان کند. در صورت مشکوک بودن به پرکاری تیروئید، به دقت مدیریت و نظارت شود. ترک ناگهانی کارودیلول ممکن است علائم پرکاری تیروئید را تشدید کند.
- اگر قرار است عمل جراحی کنید، به پزشک خود در مورد مصرف کارودیلول اطلاع دهید زیرا برخی از داروهای بیهوشی می توانند فشار خون را کاهش دهند و مصرف همزمان با کارودیلول ممکن است باعث افت شدید فشار خون شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

اگر در دوران بارداری یا شیردهی هستید پیش از مصرف این فرآورده با پزشک خود صحبت کنید.

مصرف کارودیلول در دوران بارداری می تواند به کودک شما آسیب برساند.

موارد منع مصرف

- اگر به کارودیلول و یا هر یک از مواد تشکیل دهنده این دارو حساسیت دارید.
- اگر سابقه خس خس سینه یا آسم داشته اید.
- اگر نارسایی شدید قلبی (تورم دست ها، مچ پا) دارید.
- اگر نارسایی کبدی دارید.
- اگر مشکلات قلبی مانند انسداد قلب، ضربان قلب آهسته و... دارید. کارودیلول برای مصرف در برخی افراد مبتلا به مشکلات قلبی مناسب نیست.
- اگر فشار خون بسیار پایینی دارید.

تداخلات دارویی و غذایی

در صورت مصرف هر یک از داروهای زیر، به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید:

- داروهای دیگری که برای بیماری های قلبی یا کنترل فشار خون استفاده می شود، از جمله قرص های ادرار آور، مسدود کننده های کانال کلسیم (به عنوان مثال دیلتیازم یا وراپامیل) یا داروهایی که برای کنترل نامنظم ضربان قلب استفاده می شوند (به عنوان مثال دیگوکسین و آمیودارون).
- عوامل تخلیه کننده کاتکولامین (به عنوان مثال رزپین و مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (MAOIs)، مانند ایزوکاربوکسازید و فنلزین (برای درمان افسردگی استفاده می شود)).
- فلوکستین یا پاروکستین (برای درمان افسردگی استفاده می شود).
- داروهای دیابت، مانند انسولین یا متفورمین.
- کلونیدین (برای درمان فشار خون بالا، میگرد و گرگرفتگی در دوران یائسگی).
- ریفامپیسین (برای درمان عفونت ها استفاده می شود).
- سیکلوسپورین یا تاکرولیموس (پس از پیوند عضو استفاده می شود).
- داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) مانند آسپرین، ایندومتاسین و ایبوپروفن.
- برونکودیلاتورهای بتا آگونیست (برای درمان گرفتگی قفسه سینه و خس خس سینه به دلیل آسم و یا سایر شرایط تنفسی (مانند سالبوتامول و تربوتالین سولفات)).
- آدرنالین/اپی نفرین (برای درمان واکنش های آلرژیک شدید استفاده می شود).

عوارض جانبی

مصرف هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض جانبی و ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز مکرر و آزاردهنده هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

عوارض بسیار شایع (ممکن است بیش از 1 نفر از هر 10 نفر را تحت تاثیر قرار دهد):

- احساس سرگیجه
- سردرد
- احساس ضعف و خستگی
- مشکلات قلبی مانند درد قفسه سینه، خستگی، تنگی نفس و تورم بازوها و پاها
- فشار خون پایین. علائم شامل احساس سرگیجه و یا سبکی سر است.
- احساس سرگیجه، سردرد و ضعف و خستگی معمولاً خفیف است و به احتمال زیاد در ابتدای درمان رخ می دهد.

عوارض شایع (ممکن است از هر 10 نفر 1 نفر را تحت تاثیر قرار دهد):

- عفونت های راه هوایی (برونشیت)، ریه (پنومونی)، بینی و گلو (د ستگاه تنف سی فوقانی). علائم شامل خس خس سینه، تنگی نفس، تنگی قفسه سینه و گلو درد می باشد.
- عفونت های دستگاه اداری که می تواند باعث ایجاد مشکل در عبور آب شود.
- تعداد کم گلبول های قرمز (کم خونی). علائم شامل احساس خستگی، پوست رنگ پریده، تپش قلب و تنگی نفس می باشد.

- افزایش وزن
- افزایش سطح کلسترول (با آزمایش خون نشان داده می شود).
- از دست دادن کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت.
- احساس افسردگی.
- مشکلات بینایی مانند خشکی چشم به علت کاهش تولید اشک دلیل اشک.
- ضربان قلب آهسته.
- احساس سرگیجه یا سبکی سر پس از ایستادن.
- احتباس مایع. علائم عبارتند از: تورم کلی بدن و یا تورم قسمت‌هایی از بدن مانند دست‌ها، پاها و افزایش میزان خون بدن.
- مشکلات گردش خون در بازوها و پاها. این علائم شامل سردی دست و پا، سفیدی، گزگز و درد در انگشتان دست و درد در ساق پا که در زمین راه رفتن بدتر می شود.
- مشکلات تنفسی.
- احساس بیماری.
- اسهال
- درد معده و یا سوء هاضمه.
- درد، احتمالاً در دست ها و پاها.
- مشکلات مربوط به کلیه ها، از جمله تغییرات در تعداد دفعات دفع ادرار

مسمومیت

در صورت مصرف تصادفی مقادیر زیادتر از دوز تجویز شده، سریعاً به همراه دارو به مراکز درمانی مراجعه کنید.

در صورت مصرف مقادیر زیادتر از دوز مجاز، عوارض زیر ممکن است رخ دهد:

ضربان قلب آهسته، ایست سینوسی (ضربان قلب شما بسیار کند می شود یا متوقف می شود)، احساس سرگیجه یا سبکی سر، بی نفس شدن، خس خس سینه و یا خستگی شدید.

شرایط نگهداری

در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش

