

هیدروکلروتیازید

قرص ۲۵ و ۵۰ میلی گرم

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

موارد مصرف

این دارو در یک دیورتیک است که در درمان بیماری های مختلف از جمله ادم های ناشی از نارسایی قلبی، کلیوی یا سیروز کبدی، پرفشاری خون و سایر موارد کاربرد دارد.

راهنمایی های پیش از مصرف

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- در صورت سابقه هر گونه حساسیت شدید یا ابتلا به بیماری آسم ربوی
- در صورت سابقه حساسیت به داروهای سولفونامیدی
- در صورت مصرف داروهای برهم زنده الکترولیت ها یا ابتلا به مشکلاتی نظیر سوتغذیه یا کمبود املاح معدنی بدن
- در صورت سابقه ابتلا به بیماری های فشار چشم حاد
- در صورت ابتلا به بیماری نقرس

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف دارو را بر اساس شرایط هر فرد پزشک مشخص میکند اما نحوه مصرف این دارو به شرح ذیل است:

بزرگسالان

درمان ادم: ۲۵-۱۰۰ میلی گرم روزانه

درمان پرفشاری خون: ۱۲،۵-۲۵ میلی گرم روزانه. دوز مصرفی میتواند تا ۵۰ میلی گرم روزانه نیز افزایش پیدا کند.

در صورت عدم مشاهده پاسخ مناسب از درمان باید با سایر داروهای کاهنده فشار خون ترکیب شود.

هشدارها

۱. مصرف این دارو و همچنین سایر داروهای کاهنده فشار خون می تواند منجر به برهم زدن تعادل مایعات بدن و الکترولیت ها از جمله هایپوناترمیا- هایپومگنیزمیما- هایپوکالمیا و ... شود لذا در صورت بروز تهوع و استفراغ شدید جبران الکترولیت و مایعات حائز اهمیت است.

۲. مصرف این دارو در دوزهای بالا در بیماران مبتلا به نقرس یا دارای سابقه خانوادگی نقرس به دلیل افزایش ریسک بروز علائم باید با احتیاط مصرف شود.

۳. مصرف این دارو ممکن سبب بروز حساسیت به نور بخصوص تابش مستقیم آفتاب شود. لذا از قرار گرفتن به مدت طولانی در معرض نور خورشید خودداری کنید.

۴. مصرف داروهای دیورتیک در درمان پرفشار خون بیماران مبتلا به نارسایی غده آدرنال (بیماری آدیسون) توصیه نمی شود و اولویت درمان با سایر داروهای کاهنده است.

۵. داروی هیدروکلروتیازید در بیماران دارای کلسترول خون متوسط یا بالا باید با احتیاط تجویز گردد زیرا سبب بروز افزایش کلسترول و تری گلیسیرید خون می شود.

۶. مصرف هیدروکلروتیازید در بیماران مبتلا به دیابت و پیش دیابت باید با احتیاط صورت پذیرد زیرا کنترل گلوکز خون را تغییر می دهد.

۷. مصرف این دارو در بیماران سالخورده ممکن است سبب بروز سرگیجه یا حواس پرتی و دیگر علائم ناشی از کاهش پتاسیم خون شود. بنابراین می بایست با احتیاط تجویز کرد.

۸. مصرف داروهای تیازیدی در بیماران مبتلا به نارسایی های کبدی و کلیوی می بایست با احتیاط تجویز گردد و علائم بیمار مرتباً پایش شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

مصرف این دارو در دوران بارداری در رده B قرار دارد ولیکن این دارو از جفت عبور نموده و ممکن است عوارضی بر روی نوزاد داشته باشد. همچنین این دارو مناسب ادم در دوران بارداری طبیعی نمی باشد و جز در موارد خاص با تجویز پزشک متخصص نباید مصرف شود.

داروی هیدروکلروتیازید در شیر مادر ترشح می شود لذا جز در موارد خاص و با تجویز پزشک متخصص باید باشد.

موارد منع مصرف

مصرف این دارو در شرایط زیر منع مصرف مطلق دارد و در صورت ابتلا به این شرایط با پزشک خود مشورت نمایید:

- در صورت ابتلا نارسایی شدید کلیوی یا ابتلا به آنوریا (عدم دفع ادرار)
- حساسیت به هیدروکلروتیازید یا هر ترکیب دیگر این فرآورده، سولفونامید ها و داروهای مشابه آن
- در صورت ابتلا به هایپرکلسمی

تداخلات دارویی و غذایی

- مصرف این دارو به صورت همزمان با آلوپورینول می تواند سبب افزایش ریسک بروز حساسیت به آلوپورینول شود.
- مصرف هیدروکلروتیازید و باربیتورات ها می تواند سبب افزایش بروز عارضه افت فشار خون وضعیتی و همچنین افزایش اثر داروهای کاهنده فشار خون در خون گردد.
- مصرف همزمان داروهای NSAIDs و هیدروکلروتیازید می تواند اثرات منفی بر روی کلیه ایجاد کند لذا بیمار در شرایط نیاز به مصرف مداوم این داروها باید از لحاظ کلیوی پایش شود.

عوارض جانبی

مصرف هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض جانبی و ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز مکرر و آزاردهنده هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

ضعف و خستگی بدنی- افت فشار خون وضعیتی (به ویژه در صورت مصرف همزمان با داروهای فنوباریتال یا سایر داروهای کاهنده فشار خون)- اسهال- تهوع- پانکراتیت- یبوست- دل پیچه- حساسیت های پوستی- تنگی نفس- تب- حساسیت به نور- ادم ربوی- برهم خوردن الکترولیت های بدن مانند هایپرکلسمی- هایپرگلیسمی- هایپریروریسمی- هایپوکالمی و ... - تاری دید- نارسایی کلیوی- ادم ربوی

شرایط نگهداری :

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید. دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید. از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش



تهران - ایران

REFERENCES:

1. FDALabel.com/Hydrochlorothiazide
2. Uptodate.com/UpToDate.2.0.Revision.042018
3. EMC.com