

لوزاتن-اچ® (لوزارتان پتاسیم-هیدروکلروتیازید) قرص روکشدار ۵/۱۲-۵۰ میلی گرم
موارد مصرف

- کنترل و درمان فشار خون بالا
- استفاده در بیماران مبتلا به فشار خون بالا همراه با هیپرتروفی بطن چپ

مقدار و نحوه مصرف
توجه: دوز باید به صورت فردی تنظیم شود. در بیمارانی که در حال حاضر روی هر دو دارو به طور جداگانه تحت درمان هستند یا در بیمارانی که به اندازه کافی با تک درمانی کنترل نمی شوند، محصول ترکیبی ممکن است جایگزین اجزای جداگانه شود.این دارو برای درمان اولیه فشار خون بالا توصیه نمی شود، به جز در فشار خون شدید. درمان به صورت یک عدد قرص روزانه آغاز میشود و سپس تنظیم دوز بر اساس پاسخ فشار خون بیمار و توسط پزشک صورت میگیرد. حداکثر دوز: لوزارتان ۱۰۰ میلی گرم / هیدروکلروتیازید ۲۵ میلی گرم در روز.
نحوه و مقدار مصرف در بیماری های خاص
پزشک ممکن است دوز کمتری را به خصوص در هنگام شروع درمان در برخی بیماران مانند بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی، بیماران مبتلا به نارسایی کبدی و... تجویز کند.
هشدارها

قبل از مصرف این دارو با پزشک یا داروساز خود صحبت کنید اگر:

- اگر در حال حاضر هر حال مصرف درای دیگری هستید.
- اگر کاهش دید یا درد چشم را تجربه کردید. این ها می توانند علامت تجمع مایع در لایه عروقی چشم یا افزایش فشار در چشم شما باشد و می تواند در عرض چند ساعت تا چند هفته پس از مصرف این دارو رخ دهد که می تواند منجر به از دست دادن دائمی بینایی شود، اگر درمان نشود. اگر قبلاً آلرژی به پنی سیلین یا سولفونامید داشته اید، ممکن است در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به آن باشید.
- اگر فکر می کنید باردار هستید (یا ممکن است باردار شوید)
- اگر در گذشته به دنبال مصرف هیدروکلروتیازید مشکلات تنفسی یا ریوی تجربه کرده اید.(اگر پس از مصرف این دارو دچار تنگی نفس یا مشکل در تنفس شدید، فوراً به پزشک مراجعه کنید.)
- اگر قبلاً از تورم صورت، لب ها، گلو یا زبان رنج برده اید.
- اگر از داروهای ادرارآور استفاده می کنید.
- اگر رژیم غذایی با محدودیت نمک دارید.
- اگر استفراغ و/یا اسهال شدید دارید یا داشته اید.
- اگر نارسایی قلبی دارید.
- اگر عملکرد کبد شما مختل شده است.
- اگر شریان های باریکی به کلیه های خود دارید (تنگی شریان کلیوی) یا فقط یک کلیه فعال دارید یا اخیراً پیوند کلیه انجام داده اید.
- اگر دچار تنگی شریان ها (آترواسکلروز) و یا آنژین صدری (درد قفسه سینه به دلیل عملکرد ضعیف قلب) هستید.
- اگر «تنگی دریچه آئورت یا میترال» (تنگ شدن دریچه های قلب) یا «کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک» (بیماری که باعث ضخیم شدن عضله قلب می شود) دارید.
- اگر دیابتی هستید.
- اگر نقرس داشته اید.

- اگر بیماری آلرژیک، آسم یا شرایطی که باعث درد مفاصل، بشورات پوستی و تب می شود (لوپوس اریتماتوز سیستمیک) دارید یا داشته اید.
- اگر سطح کلسیم بالا یا پتاسیم پایین دارید یا رژیم غذایی کم پتاسیم دارید.
- اگر نیاز به داروی بیهوشی دارید (حتی در دندانپزشکی) و یا قبل از جراحی، یا اگر قرار است آزمایشاتی برای بررسی عملکرد پاراتیروئید خود انجام دهید.
- اگر از هیپرالдостرونیسم اولیه رنج می برید (سندرمی که با افزایش ترشح هورمون آلدوسترون توسط غده فوق کلیوی، ناشی از ناهنجاری در این غده مرتبط است).
- اگر سرطان پوست داشته اید یا در طول درمان دچار ضایعه پوستی غیرمنتظره شده اید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی
بارداری داروهایی که بر روی سیستم رنین-آنژیوتانسین (مانند لوزارتان) اثر می‌گذارند می‌توانند باعث آسیب و مرگ جنین در حال رشد شوند. <u>پس از تشخیص بارداری در اسرع وقت مصرف این دارو را قطع کنید و به پزشک خود مراجعه کنید.</u> شیردهی

با توجه به احتمال بروز عوارض جانبی جدی در نوزاد شیرخوار، توصیه می شود با در نظر گرفتن اهمیت درمان برای مادر، تصمیم گیری در مورد قطع شیردهی یا قطع دارو اتخاذ شود.

موارد منع مصرف
- اگر به لوزارتان، هیدروکلروتیازید یا هر یک از ترکیبات دیگر این دارو حساسیت دارید، - اگر به سایر مواد مشتق شده از سولفونامید (مانند سایر تیازیدها، برخی داروهای ضد باکتری مانند کوتریموکسازول) حساسیت دارید، - اگر اختلال شدید عملکرد کبد دارید، - اگر سطح پتاسیم کم، سدیم کم یا کلسیم بالا دارید که با درمان قابل اصلاح نیست، - اگر از نقرس رنج می برید، - اگر بیش از ۳ ماه باردار هستید. (همچنین بهتر است از مصرف این دارو در ۳ ماه اول بارداری نیز اجتناب شود) - اگر عملکرد کلیه شما به شدت دچار اختلال شده یا کلیه های شما ادرار تولید نمی کنند. - اگر دیابت یا اختلال در عملکرد کلیه دارید و تحت درمان با داروهای کاهنده فشار خون حاوی الیسکیرن هستید.

تداخلات دارویی و غذایی
- در حین مصرف این قرص الکال مصرف نکنید: الکال و قرص لوزارتان پتاسیم/هیدروکلروتیازید ممکن است اثرات یکدیگر را افزایش دهند. - نمک رژیم غذایی در مقادیر بیش از حد ممکن است اثر قرص لوزارتان پتاسیم/هیدروکلروتیازید را خنثی کند. - هنگام مصرف قرص لوزارتان پتاسیم/هیدروکلروتیازید باید از مصرف آب گریپ فروت اجتناب شود.

- این دارو ممکن است پتانسیل واکنش های آلرژیک یا حساسیت به آلوپورینول و یا غلظت سرمی آلوپورینول را افزایش دهند. (خطر رده C: نیازمند نظارت بر درمان)
- مسدود کننده های گیرنده آنژیوتانسین II (لوزارتان) ممکن است اثر نامطلوب/اسمی مهارکننده های آنژیم تبدیل کننده آنژیوتانسین(لیزینوپریل، کاپتوپریل و...) را افزایش دهند. همچنین مسدود کننده های گیرنده آنژیوتانسین II ممکن است غلظت سرمی مهارکننده های آنژیم تبدیل کننده آنژیوتانسین را افزایش دهند. (خطر رده D: اصلاح درمان را در نظر بگیرید).
- محصولات ترکیبی ضد هیپاتیت ممکن است غلظت سرمی لوزارتان را افزایش دهد. (خطر رده D: اصلاح درمان را در نظر بگیرید).
- دیورتیک های تیازیدی و شبه تیازیدی (هیدروکلرتیازید) ممکن است دفع لیتیوم را کاهش دهند. (خطر رده D: اصلاح درمان را در نظر بگیرید).
- این دارو با قرص میفه پرستون تداخل دارد. (خطر رده D: اصلاح درمان را در نظر بگیرید).
- تیازید و دیورتیک‌های شبه تیازید (هیدروکلرتیازید) ممکن است اثر طولانی‌کردن QTC پرومازین را افزایش دهند. (خطر رده X از مصرف همزمان این دو دارو اجتناب کنید).
- دیورتیک های تیازیدی و شبه تیازیدی(هیدروکلرتیازید) ممکن است اثر هیپوکالمیک توپیرامات را افزایش دهند. دیورتیک های تیازیدی و شبه تیازیدی ممکن است غلظت سرمی توپیرامات را افزایش دهند. در صورت درمان همزمان غلظت پتاسیم سرم را به دقت کنترل کنید.همچنین کاهش دوز توپیرامات ممکن است ضروری باشد.(خطر رده D: اصلاح درمان را در نظر بگیرید).

عوارض جانبی

مانند همه داروها، این دارو نیز می تواند عوارض جانبی ایجاد کند، اگرچه همه افراد دچار آن نمی شوند.

اگر موارد زیر را تجربه کردید، مصرف قرص لوزارتان پتاسیم/هیدروکلروتیازید را متوقف کنید و فوراً به پزشک خود اطلاع دهید یا به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه کنید:

یک واکنش آلرژیک شدید (بثورات پوستی، خارش، تورم صورت، لب‌ها، دهان یا گلو که ممکن است باعث مشکل در بلع یا تنفس شود).

این یک عارضه جانبی جدی اما نادر است و ممکن است شما به اقدام سریع پزشکی یا بستری شدن نیاز داشته باشید.

عوارض شایع:

- سرفه، عفونت راه هوایی فوقانی، احتقان بینی، سینوزیت، اختلال سینوس،
- اسهال، درد شکم، حالت تهوع، سوء هاضمه،
- درد یا گرفتگی عضلات، پا درد، کمر درد،
- بی خوابی، سردرد، سرگیجه،
- ضعف، خستگی، درد قفسه سینه،
- افزایش سطح پتاسیم (که می تواند باعث ریتم غیر طبیعی قلب شود)، کاهش سطح هموگلوبین.
- تغییرات در عملکرد کلیه
- قند بسیار پایین در خون (هیپوگلیسمی)

مسمومیت

در صورت مصرف بیش از حد، فوراً با پزشک خود تماس بگیرید تا مراقبت های پزشکی به سرعت انجام شود. مصرف بیش از حد می تواند باعث کاهش فشار خون، تپش قلب، کندی نبض و کم آبی بدن شود.

شرایط نگهداری

این دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و به دور از نور و رطوبت نگهداری کنید. این دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش

تهران - ایران



