

آدیژان® کیدز

شربت ۱۲۰ میلی لیتر

هر ۵ میلی لیتر حاوی:

استامینوفن: ۱۶۰ میلی گرم

دیفن هیدرامین ۱۲/۵ میلی گرم

فتیل افرین ۲/۵ میلی گرم

موارد مصرف

این دارو جهت کنترل علائم سرماخوردگی (درد و تب ، احتقان و آبریزش بینی) مصرف می شود.

راهنمایی های پیش از مصرف

پیش از مصرف این دارو در موارد زیر حتما به پزشک یا داروساز مشورت کنید.

■ در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا داروهای مشابه

■ در صورت ابتلا به بیماری های مزمن

■ در صورت مصرف هر داروی دیگر

■ در صورت بارداری و شیردهی

■ نوزادان

■ ابتلا به مشکلات تنفسی

■ ابتلا به مشکلات ادراری

■ ابتلا به سو مصرف الکل

مقدار و نحوه مصرف

مقدار و نحوه مصرف این دارو با توجه به شرایط بیمار و با تجویز پزشک صورت می گیرد. اما مقدار مصرف معمول به شرح زیر است:

کودکان کمتر از ۶ سال: طبق تجویز پزشک

کودکان ۶ تا ۱۲ سال: ۱۰ میلی لیتر (۲ قاشق غذاخوری) هر ۶ ساعت

(بیشتر از ۵ نوبت در روز مصرف نشود)

■ این دارو را می توان همراه با غذا و یا با معده خالی مصرف نمود.

■ از پیمانه همراه با این دارو برای اندازه گیری مقدار مصرف استفاده نمایید.

■ در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دوبرابر کردن مقدار دارو خودداری کنید.

■ در صورت ایجاد خشکی دهان حین مصرف، آب بیشتر بنوشید.

■ مصرف این دارو هنگام خواب توصیه نمی شود.

(چند ساعت پیش از خواب مصرف شود.)

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

مصرف این دارو در دوران بارداری فقط با تجویز پزشک مجاز است.

مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود. (این دارو در شیر مادر ترشح می شود.)

هشدارها

■ در صورت سابقه حساسیت به مصرف این دارو حتما پیش از مصرف به پزشک اطلاع دهید.

■ این دارو را فقط براساس دستور پزشک یا راهنمای دارو مصرف نمایید: از مصرف مقادیر یا دفعات بیشتر از دستور راهنمای دارو خودداری نمایید.

■ نتایج آزمون های پوستی که برای تشخیص آلرژی انجام می گیرد، ممکن است تحت تأثیر مصرف این دارو واقع شود.

■ در صورت عدم بهبودی علائم طی ۵ تا ۷ روز از مصرف دارو و یا بدتر شدن آنها حتما به پزشک اطلاع دهید.

■ این دارو ممکن است باعث حساسیت به نور شود لذا حین درمان از قرار گرفتن طولانی مدت زیر نور خورشید خودداری کنید و از ضدآفتاب استفاده کنید.

■ این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی، گیجی، تاری دید و کم شدن هوشیاری در برخی افراد شود، لذا ضمن درمان از کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری کنید.

■ قبل از انجام هر گونه عمل جراحی (شامل جراحی دندان) به پزشک یا دندانپزشک خود اطلاع دهید.

■ مصرف همزمان این دارو با سایر داروهایی که حاوی استامینوفن می باشند، ممکن است منجر به مسمومیت گردد.

موارد منع مصرف

■ سابقه حساسیت به این دارو

■ مشکلات حاد ادراری

■ نوزادان

■ مشکلات حاد تنفسی مانند حمله آسم

■ همزمان با ۱۴ روز قبل از قطع داروهای مهار کننده مونوآمینواکسیداز

تداخلات دارویی و غذایی

در صورت مصرف داروهای زیر، پیش از مصرف این دارو به پزشک اطلاع دهید.

ب‌تابلوگر ها (مانند پروپرانولول)، فورازوایدون، ایندومتاسین، ایزونیازید، داروهای مهارکننده منوآمین اکسیداز (مانند فنلژین)، ضد افسردگی سه حلقه ای (مانند آمی تریپتیلین)، گوانتیدین، مکامیل آمین، متیل دوبا، رزربین، داروهای ضد انعقاد (مانند وارفارین)، دیگوکسین، بروموکریپتین، فنی توئین

عوارض جانبی

هر دارو به موازات اثرات مفید ممکن است عوارض جانبی ایجاد کند که البته در همه افراد رخ نمی دهد، در صورت بروز مکرر و آزاردهنده هر یک از عوارض زیر به پزشک مراجعه کنید.

یبوست، اسهال، گیجی، خواب آلودگی، تحریک پذیری، تهوع، استفراغ، مشکلات خواب، ضعف

مسمومیت

در صورت مصرف تصادفی بیشتر از مقداری معمول یا تجویز شده، به پزشک به مراکز درمانی مراجعه کنید.

شرایط نگهداری :

در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود.

دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

پس از هر بار مصرف پیمانه را بشویید.

پس از هر بار مصرف درب ظرف را محکم ببندید.

شرکت کارخانجات داروپخش

تهران - ایران



References:

Medicines.Org.UK/EMC