

پماد، کرم فلوئوسینولون

0.025%

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

• دسته دارویی

کورتیکواستروئیدها، ضد التهاب

• موارد مصرف

تسکین التهابات، خارش، حساسیت و آگزماهای پوستی

• راهنمایی های پیش از مصرف

پیش از مصرف این دارو در موارد زیر حتما با پزشک یا داروساز مشورت کنید:

- سابقه حساسیت به فلوئوسینولون یا سایر کورتیکواستروئیدها یا ترکیبات مندرج

- ابتلا به بیماری های مزمن و یا مصرف سایر داروها
- در صورت ابتلا به بیماری ها یا عفونت های پوستی

• مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف دارو را بر اساس شرایط هر فرد توسط پزشک مشخص می شود ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

- در بیماران مبتلا به حساسیت، التهابات پوستی و ... یک لایه نازک

از پماد یا کرم فلوئوسینولون ۲-۴ بار در روز استعمال شود.

- مصرف مداوم بیشتر از ۲ هفته جز در صورت تجویز پزشک متخصص توصیه نمی گردد.

• هشدارها

- در صورت مصرف طولانی مدت داروی فلوئوسینولون در سطح گسترده این دارو می تواند از سطح پوست جذب شده و سبب عوارض جانبی متعدد و سرکوب سیستم ایمنی گردد.

- در صورت تشدید علائم درماتیت در دوره درمان و عدم بهبودی علائم به پزشک متخصص مراجعه نمایید.

- در صورت مشاهده علائم موضعی غیر قابل برگشت (آتروفی پوست، خشکی پوست، تشدید التهابات و ...) از ادامه مصرف دارو خودداری نمایید.

- در صورت مشاهده بروز علائم عفونت پوستی از مصرف دارو خودداری نمایید و درمان را با آنتی بیوتیک های موضعی جایگزین نمایید.

- جذب پوستی در کودکان بیشتر است لذا در صورت مصرف طولانی مدت از این دارو، کودکان باید از نظر میزان رشد، بروز علائم سرکوب هیپوتالامیک و ... پایش شوند.

• مصرف در دوران بارداری و شیردهی

- مصرف این دارو در خانم های باردار جز در صورت تجویز پزشک متخصص ممنوع می باشد.

- مصرف این دارو در خانم های شیرده به علت جذب پوستی دارو در شیر ترشح می شود و ممکن است روی نوزاد تاثیر بگذارد بنابراین مصرف این دارو توصیه نمی شود.

• موارد منع مصرف

- حساسیت به فلوئوسینولون یا سایر ترکیبات مندرج

- در صورت سابقه حساسیت به سایر کورتیکواستروئیدها

- در صورت تزریق واکسن از استعمال بر روی محل تزریق خودداری نمایید.

- در صورت مشاهده ضایعه عفونی یا قارچی از این محصول استفاده نکنید.

• عوارض جانبی

مصرف هر دارو می تواند در کنار اثرات مفید، عوارض جانبی ایجاد کند که البته در همه افراد رخ نمی دهد.

در صورتیکه هر یک از عوارض زیر رخ داد با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

سندروم کو شینگ، تشدید آلرژی های تماسی، سوختگی، خشکی پوست، قرمزی، خارش، براق شدن پوست، آتروفی پوست، تبخال و ...

• شرایط نگهداری :

دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

دارو را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور نگه داشته و از یخ زدگی محافظت نمایید.

شرکت کارخانجات داروپخش



تهران - ایران

REFERENCES:

Uptodate/UpToDate.2.0.Revision.042018

www.accessdata.fda.gov/FDA label