

کورتام* (کلوبتازول)

کرم- پماد و لوسیون موضعی

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

موارد مصرف

این دارو برای درمان التهابات پوستی یا تظاهرات پوستی خارش دار نظیر اگزما، حساسیت های پوستی، قرمزی و کپهر در سطح پوست استفاده می شود.

راهنمای های پیش از مصرف

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

۱. وجود هر نوع حساسیت نسبت به کلوبتازول یا سایر کورتیکواستروئیدها مانند بتامتازون، تریامسینولون، فلوئوسینولون و ...، همچنین حساسیت به مواد دیگر مثل غذاها، مواد محافظ و رنگ ها .
۲. در مصرف طولانی مدت و بروز علائم سیستمیک
۳. در صورت مصرف دارو توسط کودکان و سالمندان.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف دارو را بر اساس شرایط هر فرد پزشک مشخص میکند اما نحوه مصرف این دارو به شرح ذیل است:

بزرگسالان بالای ۱۸ سال: ۱ یا ۲ مرتبه در روز، یک لایه نازک بر روی پوست مالیده شود تا زمانیکه بهبودی حاصل گردد. (حداکثر زمان مصرف ۱ هفته می باشد).

در افراد کمتر از ۱۸ سال مصرف این دارو جز با تجویز پزشک توصیه نمی گردد.

مصرف در بیماری های خاص

مصرف این دارو در بیمارانی که مشکلات زیر را دارند و کورتیکواستروئیدهای موضعی درمانی برای آنها بحساب نمی آید منع مصرف دارد:

۱. ابتلا به پسوریازیس (جز در مواردی که سطح ضایعه وسیع است)
۲. لیخن پلاک
۳. لوپوس دیسکی
۴. درماتوزهای مقاوم

هشدارها

- در صورت عدم بهبودی در طی ۲-۴ هفته به پزشک جهت ارزیابی مجدد ضایعه مراجعه نمایید.
- درمان با این دارو نباید بیشتر از ۴ هفته به طول انجامد و در صورت الزام، درمان باید با یک کورتیکواستروئید ضعیف تر ادامه پیدا کند.
- منطقه مورد نظر را پانسمان نکنید زیرا به علت افزایش جذب دارو سبب تشدید عوارض جانبی می گردد.
- در صورت مصرف این دارو در کودکان بر روی مناطقی از پوست که در تماس با ادرار هستند، از بکار بردن کهنه بچه یا شورت پلاستیکی اجتناب کنید. زیرا احتمال تشدید عوارض جانبی دارو وجود دارد.
- در صورت مشاهده علائم موضعی و عدم بهبود پس از قطع دارو در محل استعمال مانند کاهش رنگ پوست، جوش های پوستی، بروز آلرژی در محل، آتروفی پوستی به پزشک مراجعه نمایید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

مصرف این دارو در بارداری و شیردهی به دلیل عدم وجود اطلاعات غیرمجاز است مگر در موارد اضطراری و به تشخیص پزشک متخصص.

موارد منع مصرف

این دارو در درصورت ابتلا به بیماری های عفونی یا ویروسی، عفونت قارچی یا باکتریایی پوستی، جراثحت، التهاب ناشی از تزریق واکسن، آکنه روزاسه، پرورایتیس(خارش و قرمزی به ویژه در شب ها) نواحی ژئیتال و مقعدی منع مصرف دارد.

عوارض جانبی

مصرف هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض جانبی و ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز مکرر و آزاردهنده هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید. در حین مصرف این دارو ممکن است عوارض زیر رخ دهد:

خارش، سوختگی و درد در ناحیه استعمال، بروز مویرگ های تار عنکبوتی، نازکی پوست، خشکی پوست، بروز چروک پوستی و ...

شرایط نگهداری :

دارو در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد
دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش

تهران - ایران



REFERENCES:

Medicines.org.uk/EMC

WWW.Uptodate.Com