

بوپرنورفین 2 میلی گرم

بوپرنورفین 8 میلی گرم

قرص زیرزبانی

موارد مصرف

این دارو متعلق به دسته ضد دردهای اپیوئیدی می باشد که جهت درمان اعتیاد به مخدرها و فقط زیر نظر پزشک باید مصرف شود.

راهنمائی های پیش از مصرف

پیش از مصرف این دارو در موارد زیر حتماً با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

- در صورت سابقه حساسیت به بوپرنورفین یا داروهای مشابه
- در صورت ابتلا به بیماری های تنفسی
- در صورت ابتلا به بیماری های کبدی، اعتیاد به الکل و یا ابتلا به کبد الکلی
- داشتن توهم های شنیداری و دیداری (در اثر مصرف داروها یا الکل)
- در صورت بارداری و شیردهی
- در صورت ابتلا به بیماری های کلیوی و غدد فوق کلیه
- در صورت داشتن مشکلات تیروئیدی
- در صورت سابقه آسیب به سر و یا صدمات مغزی
- فشار خون پایین
- مشکلات دستگاه ادراری (در آقایان)

مقدار و نحوه مصرف

مقدار و نحوه مصرف این دارو با توجه به شرایط بیمار با تجویز پزشک صورت می گیرد اما دوز معمول آن به شرح زیر است:

دوز شروع دارو برای بزرگسالان بالای 18 سال: 2 تا 8 میلی گرم روزانه

دارو را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف کنید.

این دارو باید حداقل 4 تا 6 ساعت پس از مخدرها (متادون و...) مصرف شود.

دارو را همزمان با غذا و نوشیدنی مصرف نکنید.

مصرف این دارو به صورت زیرزبانی میباشد: دارو را تا زمان حل شدن کامل زیر زبان خود نگاه دارید و از جویدن و یا بلعیدن قرص حل نشده خودداری کنید.

هرگز مصرف دارو را به صورت ناگهانی قطع نکنید.

هشدارها

- در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا داروهای مشابه و یا بروز علائم حساسیت پیش از مصرف حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.
- این دارو ممکن است باعث وابستگی شود و حتماً باید زیر نظر پزشک مصرف شود.
- از قطع ناگهانی مصرف دارو خودداری کنید.
- مصرف این دارو به دلیل ضد درد بودن ممکن است منجر به پوش علائم بعضی از بیماری ها شود. لذا حین معاینات، پزشک خود را از مصرف این دارو مطلع سازید.
- مصرف این دارو موجب خواب آلودگی می شود، لذا حین مصرف از رانندگی و کارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری کنید.
- مصرف این دارو در افراد زیر 16 سال توصیه نمی شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

مصرف این دارو در زمان بارداری و شیردهی مجاز نیست. مگر به صلاحدید پزشک

موارد منع مصرف

حساسیت به دارو، نارسایی کبد، نارسایی سیستم تنفسی، شیردهی، اعتیاد به الکل

تداخلات دارویی و غذایی

مصرف همزمان با آسپرین، آمپودارون، ایزونیاژید و والپروات ممکن است منجر به آسیب کبدی شود.

مصرف همزمان این دارو با بنزدوبازین ها (دیازپام، الپرازولام و...)، کدئین، متادون، مورفین، داروهای مهار کننده آنزیم MAO و ضد افسردگی (ها) مانند سلزپیلین، مکلومیاید، هیدرازین، ترانئیل سیپرومین، آمی تریپتیلین و...، آنتی هیستامین ها، باربیتورات ها، کلروپرومازین، هالوپریدول و کلونیدین موجب افزایش اثرات سیستم عصبی مرکزی مانند خواب آلودگی و گیجی می شود.

داروهای ضد ویروس و ضد قارچ مانند کتوکنازول، ریتوناویر، داروهای ضد بارداری و ماکرولیدها (آزیترومایسین، کلاریترومایسین و...) موجب افزایش غلظت بوپرنورفین در خون می شوند.

مصرف همزمان این دارو با متادون و نالتروکسان موجب بروز سندرم قطع مصرف می شود.

حین مصرف این دارو از مصرف فراورد های حاوی الکل خودداری کنید.

عوارض جانبی

مصرف هر دارو می تواند در کنار اثرات مفید، عوارض جانبی ایجاد کند که البته در همه افراد رخ نمی دهد. در صورتیکه هر یک از عوارض زیر به صورت مکرر و آزادنده رخ داد با پزشک یا داروساز جهت ادامه درمان مشورت کنید.

سردرد، تعریق، بی خوابی، تهوع، بی قراری، اضطراب، ضعف عضلانی، درد مفاصل، درد استخوان، درد قفسه سینه، یبوست، درد شکم، نفخ، اسهال، خواب آلودگی، گیجی، پرخاشگری، تورم غدد لنفاوی، اسپاسم عضلانی، گشاد شدن مردمک ها، احساس تپش قلب، شک و تردید، سوزش کف دست و پا، افکار پریشان، لرزش، گرگرفتگی، استفراغ، خیمازه، سرگیجه ناگهانی ناشی از افت فشار وضعیتی

مسمومیت

مصرف بیش از اندازه این دارو خطرناک است و می تواند کشنده باشد، لذا در صورت مصرف تصادفی بیش از مقادیر تجویز شده، سریعاً همراه با دارو به بیمارستان مراجعه کنید.

شرایط نگهداری

دارو را در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگه دارید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

از نگهداری داروهای تاریخ مصرف گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش

تهران - ایران



Reference: Medicines. Org. UK/ EMC