

ویال استامینوفن

محلول جهت انفوزیون وریدی

هر ویال حاوی:

استامینوفن 10 میلی گرم در 1 میلی لیتر (100 میلی لیتر)

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.

دسته دارویی

ضد درد و ضد التهاب

موارد مصرف

این دارو در درمان کوتاه مدت درد و تب متوسط تا شدید در کودکان و بزرگسالان استفاده می شود.

راهنمایی های پیش از مصرف

هشدار و احتیاط

مصرف این دارو در دوزهای بالاتر از 4 گرم در روز برای بزرگسالان می تواند منجر به آسیب های کبدی شود. پیش از مصرف این دارو در موارد زیر حتما با پزشک یا داروساز مشورت کنید:

1. در صورت ابتلا به بیماری های کبدی و کلیوی
2. در صورت بارداری یا شیردهی
3. در صورت مصرف هرگونه دارو به صورت مزمن
4. در صورت اعتیاد به الکل
5. در صورت ابتلا به سوء تغذیه مزمن
6. در صورت ابتلا به هیپوولمی شدید (کم آبی بدن)
7. در صورت ابتلا به فاویسم (کمبود G6PD) (احتمال بروز کم خونی همولیتیک)
8. در صورت ابتلا به نارسایی شدید کلیوی (در بیماران با کلیرانس کراتینین کمتر از 30 با احتیاط مصرف شود).

موارد منع مصرف

1. حساسیت شدید به استامینوفن
2. ابتلا به نارسایی شدید کبدی

مقدار و نحوه مصرف

این محلول در مدت زمان حداقل 15 دقیقه به صورت انفوزیون وریدی تجویز می‌شود. این دارو با سرم های دکستروز 5٪، سدیم کلراید 0.9٪، رینگر و رینگر لاکتات سازگار است. در این صورت، محلول رقیق شده را ظرف یک ساعت پس از تهیه (با احتساب زمان انفوزیون) استفاده کنید. محلول استفاده نشده باید دور ریخته شود.

پیش از تزریق دارو، محلول را بررسی نمایید تا شفاف و فاقد هرگونه ذره باشد. در غیر این صورت از مصرف آن خودداری نمایید.

مقدار و نحوه مصرف دارو برای هر بیمار توسط پزشک معالج تجویز می‌شود، اما دوز مصرفی پیشنهادی بر اساس وزن به شرح ذیل می‌باشد. **مصرف کامل ویال 100 میلی لیتری در یک دوز در بیماران با وزن کمتر از 50 کیلوگرم توصیه نمی‌شود.** فلذا لازم است توسط پزشک محترم تنظیم دوز براساس وزن بدن بیمار انجام پذیرفته و حجم مناسب تزریق گردد.

سن	مقدار توصیه شده بر حسب میلی گرم دارو	مقدار توصیه شده بر حسب حجم تزریق دارو	فواصل مصرف	ماکزیمم دوز روزانه
بیماران ≥ 10 کیلوگرم	7.5 mg/ kg	0.75 ml/ kg	هر 6 ساعت	30 mg/kg
بیماران < 10 کیلوگرم تا ≥ 33 کیلوگرم	15 mg/kg	1.5 ml/ kg	هر 6 ساعت	60 mg/kg (2000 mg/day)
بیماران < 33 کیلوگرم تا ≥ 50 کیلوگرم	15 mg/kg	1.5 ml/ kg	هر 6 ساعت	60 mg/kg (3000 mg/day)
بیماران ≤ 50 کیلوگرم با خطر سمیت کبدی	1000 mg	100 ml	هر 6 ساعت	3000 mg/day
بیماران ≤ 50 کیلوگرم فاقد خطر سمیت کبدی	1000 mg	100 ml	هر 6 ساعت	4000 mg/day

- توصیه می‌شود هنگام تجویز استامینوفن به بیماران مبتلا به اختلال شدید کلیوی (کلیرانس کراتینین کمتر از 30 میلی‌لیتر در دقیقه)، دوز را کاهش داده و حداقل فاصله بین هر دوز را به 6 ساعت افزایش دهید.
- بزرگسالان مبتلا به نارسایی کبدی، الکلیسم مزمن، سوء تغذیه مزمن (ذخایر کم گلوکاتایون کبدی)، کم آبی بدن حداکثر دوز روزانه نباید از 3 گرم تجاوز کند.

تداخل دارویی

- حین مصرف این دارو از مصرف فرآورد های حاوی الکل به علت افزایش ریسک سمیت کبدی اکیدا خودداری کنید
- مصرف همزمان استامینوفن با داروهای خانواده باربیتورات ها و کاربامازپین سبب افزایش متابولیسم استامینوفن و همچنین افزایش ریسک آسیب های کبدی می شود.
- مصرف همزمان استامینوفن و وارفارین سبب افزایش INR و در نتیجه افزایش اثر وارفارین می شود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

استامینوفن از جفت عبور می کند ولی اثر تراژوژنی از این دارو مشاهده نشده است لذا میتوان گفت مصرف این دارو در دوران بارداری کم خطر است.
این دارو در شیر مادر نیز ترشح می شود ولی برای کودک بی خطر است و مصرف آن بلامانع است.

عوارض جانبی

استامینوفن همانند سایر داروها می تواند موجب بروز عوارض ناخواسته شود. هر چند این عوارض در همه افراد مصرف کننده بروز نخواهد داد. در صورت بروز مکرر و آزاردهنده هر عارضه با پزشک خود مشورت کنید.

از جمله عوارض جانبی جدی دارو میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- در صورت بروز هرگونه علائم حساسیتی از جمله تورم صورت، دهان، گلو، سختی تنفس، راش پوستی، کهیر و خارش ضمن قطع مصرف دارو به پزشک مراجعه نمائید.
- در صورت خونریزی از بینی یا لثه که ممکن است ناشی از سطح غیرطبیعی پایین برخی از انواع سلول های خونی (پلاکت ها، گلبول های سفید) باشد، به پزشک مراجعه نمایید.

سایر عوارض جانبی:

- گوارشی: تهوع، استفراغ، یبوست، اسهال، درد شکم
- قلبی عروقی: فشار خون بالا، افت فشار خون، ادم محیطی، تاکی کاردی
- سیستم عصبی مرکزی: سردرد، بی خوابی و خستگی
- کبدی: افزایش ترانس آمینازهای سرم
- موضعی: درد در محل تزریق

شرایط نگهداری دارو

دارو را در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری و از قراردادن دارو در یخچال خودداری کنید.
دارو را از یخ زدگی محافظت کنید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

شرکت کارخانجات داروپخش

تهران - ایران

