

دی پی فن®

استامینوفن / کافئین / ایبوپروفن

کپسول

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمایید .

الف) راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید :

- 1- سابقه هرگونه حساسیت به استامینوفن، کافئین، ایبوپروفن و یا سایر داروهای ضد درد به خصوص آسپرین، کتورولاک، اکسی فن بوتازون.
- 2- سابقه حساسیت به سایر داروها و غذاها، رنگها، مواد محافظ و غیره.

3- در صورت بارداری و شیردهی

4- در صورت مصرف هرگونه دارو چه با نسخه و چه بدون نسخه پزشک به خصوص کاربامازپین، ایزونیاژید، فنی توئین، وارفارین، کورتیکواستروئیدهای خوراکی، کورتیکوتروپین، مکملهای حاوی پتاسیم، هپارین، والپروئیک اسید، آسپرین، سیپروفلوکساسین، ایتراکونازول، کتوکونازول، افلوکساسین، تتراسایکلین ها، سیکلوسپورین، گلیکوزیدهای دیژیتال، لیتیم، متوترکسات، پروبنسید، تریامترن، آمانتادین، آمفتامین ها، داروهای ضد اشتها، بوپروپیون، فلوکستین، داروهای تنفسی، داروهای ضد سرماخوردگی و ضد آلرژی، متیل فنیدیت، پاروکستین، سرتالین، مهار کننده های MAO.

5- در صورت ابتلا به بیماریهایی مانند: اضطراب و ترس از قرار گرفتن در محیطهای باز، تشنج، بیماریهای قلبی و افزایش فشارخون، حملات پانیک، بی خوابی، بیماریهای کبدی و کلیوی، هیاتیت، مشکلات خونی، کولیت و یا سایر بیماریهای دستگاه گوارش، دیابت ملیتوس، هموروئید، لوپوس، کم خونی، آسم، سنگ کلیه، تورم پاها، کاهش پلاکت و یا گلبولهای سفید، بیماریهای مغزی، پارکینسون، پلی میالژیا، پروفیریا، زخم و یا وجود دانه های سفید در دهان .

در طول مصرف این دارو رعایت نکات زیر توصیه می گردد:

- 1- دارو را بیش از میزان تجویز شده مصرف نکنید. زیرا ممکن است باعث آسیب به کلیه و کبد شود.
- 2- دارو را همراه با یک لیوان پر از آب میل نمایید. و در حدود 15-30 دقیقه پس از آن از دراز کشیدن و خوابیدن خودداری کنید.
- 3- به منظور کاهش مشکلات معده، دارو را همراه با غذا و یا با آنتی اسید مصرف کنید. بدین منظور آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیم بهترین نوع هستند.
- 4- دارو را بطور کامل بلعید و از خارج کردن محتویات کپسول خودداری کنید.
- 5- در صورتی که این دارو را برای آرتریت مصرف می نمایید، دارو را به طور منظم و طبق تجویز پزشک مصرف کرده و مصرف دارو را حداقل تا دو هفته ادامه دهید.

ب) مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی ممنوع می باشد.

پ) هشدارها :

- 1- در صورتی که پس از گذشت 10 روز از مصرف دارو، درد شما بدتر شد و یا علائم جدیدی ایجاد شد و یا ناحیه دردناک قرمز و یا متورم شد به پزشک و یا دندانپزشک خود مراجعه کنید.

2- در صورتی که دارو را به منظور کاهش تب مصرف می کنید و پس از گذشت سه روز تب قطع نشد و یا بدتر شد، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

3- در صورتی که دارو را برای گلو درد مصرف می کنید و گلو درد بیش از دو روز ادامه یافت و یا با تب، سردرد، بثورات جلدی، تهوع و استفراغ همراه شد، به پزشک مراجعه کنید.

4- به منظور کاهش عوارض جانبی دارو از مصرف سایر داروهای ضد درد غیر استروئیدی و یا آسپرین همراه با این دارو خودداری کنید.

5- استامینوفن موجود در این فرآورده، ممکن است با نتایج برخی تستهای آزمایشگاهی تداخل داشته باشد لذا در طول مصرف این دارو و 4-3 روز پس از آن از انجام تستها خودداری کرده و یا با پزشک خود مشورت کنید.

6- کافئین موجود در این فرآورده با تستهایی که در آن از ادنوزین و یا دی پیریدامول استفاده می کنند تداخل دارد، لذا 12-8 ساعت قبل از انجام این تستها از مصرف این دارو خودداری کنید.

7- اگر دارو را برای آرتریت روماتوئید مصرف می کنید، جهت بررسی پیشرفت درمان در فواصل زمانی منظم به پزشک مراجعه کنید.

8- از مصرف سایر داروهای ضد درد به خصوص آسپرین و یا کتورولاک با این دارو بپرهیزید.

9- قبل از هرگونه عمل جراحی، پزشک و یا دندانپزشک را از مصرف این دارو مطلع سازید.

10- مصرف این دارو در برخی افراد سبب بالارفتن حساسیت پوست بدن نسبت به اشعه آفتاب می شود، بنابراین در حین مصرف این دارو از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض تابش آفتاب خودداری کنید و از کرمهای ضد آفتاب استفاده کنید.

11- در طول درمان با این دارو ممکن است عوارض شدیدی مانند زخم یا خونریزی گوارشی روی دهد که علائم آن عبارتند از: درد، سوزش یا اسپاسم های شکم، مدفوع سیاه، تهوع شدید و مداوم، سوزش سردل، سوء هاضمه و استفراغ ، خون و یا مواد قهوه ای رنگ. در صورت بروز هر یک از علائم ذکر شده بلافاصله مصرف دارو را قطع و به پزشک مراجعه کنید.

12- در صورت بروز لرز، تب، درد عضلاتی، بثورات جلدی یا علائم شبه آنفلوانزا فوراً به پزشک خود مراجعه کنید. زیرا این علائم، نشان دهنده بروز عوارض جانبی جدی این دارو می باشد.

13- به ندرت ممکن است این دارو سبب ایجاد واکنشهای آنافیلاکسی شود که علائم آن عبارتند از: تنفس تند یا نامنظم، نفس نفس زدن، خس خس سینه یا ضعف، تغییر رنگ چهره، غش و ورم پلکها. در صورت مشاهده هر یک از علائم فوق فوراً به پزشک خود مراجعه کنید.

14- در حین درمان با این دارو، از نوشیدن مقادیر زیاد چای و یا قهوه ، شیرکاکائو و شکلات خودداری کنید.

15- کافئین موجود در این دارو، ممکن است سبب افزایش حساسیت، تحریک پذیری، اشکال در به خواب رفتن، سرگیجه و یا افزایش ضربان قلب شود. در صورت مشاهده علائم فوق مصرف دارو را قطع کرده فوراً به پزشک مراجعه کنید.

16- به منظور جلوگیری از بی خوابی، از مصرف این دارو در هنگام خواب خودداری کنید.

ت) مقدار ونحوه مصرف :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند. ولی مقدار مصرف معمول این دارو بصورت زیر است:

1 کپسول هر چهار تا شش ساعت

ث) عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ، ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته شود . اگر چه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ، لیکن در صورت بروز هریک از عوارض زیر فوراً با پزشک مشورت کنید :

زردی پوست ویا چشم، تنفس سریع و یا نامنظم، ضربان قلب سریع و یا نامنظم، تورم صورت، پلک، دهان، لب و زبان، تورم مژه ها و یا اطراف چشم ها، تنفس کوتاه و یا اشکال در تنفس، وزوز گوش و گرفتگی قفسه سینه، اسهال، سرگیجه، هایپرگلاسمی، تاری دید، خواب آلودگی، خشکی دهان، خشکی پوست، افزایش ادرار، بی اشتها، سوزش، تحریک پذیری، بی قراری، بی خوابی.

سایر عوارض به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مانند درد یا کرامپ شکم و معده، اسهال، سرگیجه، خواب آلودگی، سردرد، سوزش سر دل، سوء هاضمه، تهوع، استفراغ، ناآرامی و عصبانیت بیش از اندازه.

ج) مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار را به بیمارستان منتقل کنید.

چ) شرایط نگهداری :

دارو را در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد ، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید .

از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش
تهران - ایران



Ref:

USPDI, Advice for the patient Drug information in lay language 2007