

قطره چشمی کتورولاک ۵/۰٪

قطره استریل چشمی (۵ میلی لیتر)

هر ۱۰۰ میلی لیتر حاوی ۵/۰ گرم کتورولاک ترومتامین است.

• دسته دارویی:

ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs)

• مکانیسم اثر:

یک عامل ضد التهابی غیر استروئیدی است که دارای فعالیت ضد درد و ضد التهابی است.

• موارد مصرف:

برای پیشگیری و کاهش التهاب و علائم مرتبط پس از جراحی چشم توصیه می شود.

این قطره در بزرگسالان اندیکاسیون دارد.

• موارد منع مصرف:

حساسیت به کتورولاک ترومتامین
حساسیت به استیل سالیسیلیک اسید و سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی

• موارد احتیاط مصرف:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده، از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمایید.

فقط برای استفاده چشمی است.

فرآورده محلول شفاف و بی رنگ تا زرد کم رنگ است. در صورت مشاهده تغییر رنگ یا کدورت در محلول از مصرف فرآورده خودداری شود.

از مصرف همزمان با لنزهای تماسی نرم خودداری کنید. فرآورده حاوی بنزالکونیوم کلراید می باشد؛ لذا در صورت استفاده از لنزهای تماسی نرم، قبل از مصرف دارو لنز را از چشم خارج کرده و ۱۵ دقیقه پس از مصرف دارو از لنز استفاده نمایید.

بنزالکونیوم کلراید باعث تحریک چشم و خشکی چشم می شود و ممکن است بر لایه اشکی و سطح قرنیه تاثیر بگذارد. در بیماران مبتلا به خشکی چشم و بیماران دارای قرنیه آسیب دیده با احتیاط مصرف شود. در صورت استفاده طولانی مدت، بیماران باید تحت نظر باشند.

از تماس نوک قطره چکان با چشم و سطوح دیگر اجتناب کنید.

پس از هر بار مصرف، درپوش ظرف را محکم ببندید.

غلظت سیستمیک دارو به دنبال تجویز موضعی چشمی اندک است.

اگر بیش از یک داروی موضعی چشمی استفاده می کنید، داروها باید حداقل با فاصله ۵ دقیقه مصرف شوند.

پمادهای چشمی باید در آخر مصرف شوند.

همه داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) از جمله قطره چشمی کتورولاک ۵/۰٪ ممکن است روند بهبود زخم را کند کرده و یا به تأخیر بیندازد. استفاده همزمان از NSAID ها و استروئیدهای موضعی می تواند در روند بهبودی خلل ایجاد کند.

این محصول ممکن است سبب بروز تاری دید موقت و گذرا شود. در صورت مصرف دارو، بیمار باید قبل از رانندگی یا استفاده از ماشین آلات مبر کند تا دید او واضح شود.

دارو اگر به طور تصادفی بلعیده شود، برای رقیق شدن مایعات بنوشید.

در بیماران که مستعد خونریزی هستند و یا داروهایی دریافت می کنند که ممکن است زمان خونریزی را طولانی تر کند، این دارو با احتیاط استفاده شود.

مشابه سایر داروهای ضد التهابی، ممکن است علائم معمول عفونت را بپوشاند.

مصرف همزمان قطره چشمی کتورولاک ۵/۰٪ و کورتیکواستروئیدهای موضعی در بیماران مستعد تخریب اپیتلیال قرنیه باید با احتیاط انجام شود.

استفاده از NSAIDs موضعی ممکن است منجر به کراتیت شود. در برخی بیماران، استفاده مداوم از NSAID های موضعی ممکن است منجر به تجزیه اپیتلیال، نازک شدن قرنیه، فرسایش قرنیه، زخم قرنیه یا سوراخ شدن قرنیه شود. این رویدادها ممکن است بینایی را تهدید کند. بیماران که شواهدی از تجزیه اپیتلیال قرنیه دارند فوراً باید مصرف NSAID های موضعی را قطع کنند و از نظر سلامت قرنیه به دقت تحت نظر باشند.

در جراحی های پیچیده چشمی، عصب کشی قرنیه، تقایم اپیتلیال قرنیه، دیابت، بیماری های سطح چشم (مانند سندرم چشم خشک)، آرتريت روماتوئید، یا تکرار جراحی چشم در مدت کوتاه، باید با احتیاط از NSAID های موضعی استفاده شود. چرا که ممکن است این افراد در معرض خطر عوارض جانبی قرنیه باشند و این عوارض ممکن است تهدید کننده بینایی باشند.

در صورتی که دارو بیش از ۲۴ ساعت قبل از جراحی و یا بیش از ۱۴ روز پس از جراحی استفاده شود ممکن است خطر بروز و شدت عوارض جانبی قرنیه را افزایش دهد.

اسپاسم برونش یا تشدید آسم در بیماران که حساسیت شناخته شده به آسپرین و یا داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی دارند و یا در گذشته سابقه آسم در اثر مصرف قطره چشمی کتورولاک ۵/۰٪ داشته اند، گزارش شده است. توصیه می شود این افراد قطره چشمی کتورولاک ۵/۰٪ را با احتیاط مصرف کنند.

جهت کاهش عوارض جانبی، کمترین دوز موثر در

کوتاه ترین مدت لازم برای کنترل علائم مصرف شود.

• مقدار و نحوه مصرف:

_ التهاب بعد از عمل: یک قطره سه بار در روز از ۲۴ ساعت قبل از عمل شروع شده و تا سه هفته بعد از عمل ادامه می یابد.

_ جمعیت کودکان: از این دارو در کودکان برای موارد روبه رو استفاده نشود: برای پیشگیری و کاهش التهاب پس از جراحی آب مروارید.

_ روش مصرف: ابتدا دست های خود را با آب گرم و صابون خوب شسته و خشک کنید. حال پلک پایین را به آرامی به سمت پایین بکشید و به سمت بالا نگاه کنید و سپس یک قطره از محلول را در کیسه ملتحمه تحتانی چشم مورد نظر بچکانید.

• بارداری:

اطلاعات کافی از مصرف این قطره در زنان باردار وجود ندارد. مصرف آن در دوران بارداری توصیه نمی شود.

• شیردهی:

با احتیاط و زیر نظر پزشک متخصص مصرف شود.

• تداخلات دارویی:

تداخل دارویی خاصی یافت نشده است.

• عوارض جانبی:

شایع ترین عوارض جانبی گزارش شده سوزش گذرا هنگام مصرف قطره است.

_ اختلالات سیستم ایمنی

شایع (۱٪ تا ۱۰٪): حساسیت از جمله واکنش های آلرژیک موضعی

_ اختلالات سیستم عصبی

شایع (۱٪ تا ۱۰٪): سردرد

_ اختلالات چشمی

بسیار شایع (بیشتر از ۱۰٪): تحریک چشم (از جمله احساس سوزش)، درد چشم (از جمله سوزش)

شایع (۱٪ تا ۱۰٪): کراتیت سطحی (نقطه دار)، ادم چشم و یا پلک، خارش چشم، پر خونی ملتحمه، عفونت چشم، التهاب چشم، التهاب عنبیه، رسوب در قرنیه، خونریزی شبکیه، ادم ماکولا سیستوئید، ضربه چشم، افزایش فشار داخل چشم، تاری و یا کاهش دید

غیر معمول (۱۰٪ تا ۱٪): زخم قرنیه، Corneal Infiltration، خشکی چشم، ازدیاد جریان اشک (Epiphora)

ناشناخته (غیر قابل تخمین): آسیب قرنیه (به عنوان مثال: نازک شدن، فرسایش، شکستگی و سوراخ شدن

اپیتلیال*)، کراتیت اولسراتیو، تورم چشم، پر خونی چشمی

_ اختلالات تنفسی، قفسه سینه و مدیاستن
ناشناخته (غیر قابل تخمین): برونکواسپاسم یا تشدید آسم**

* این موارد عمدتاً در بیمارانی که همزمان از کورتیکواستروئیدهای موضعی استفاده می کنند و دارای بیماری های مستعد کننده هستند، رخ می دهد.

** بیمارانی که به آسپرین و یا NSAIDs حساسیت دارند و یا در گذشته سابقه آسم در اثر مصرف قطره چشمی کتورولاک ۵/۰٪ داشته اند، بیشتر مستعد هستند.

• شرایط نگهداری:

_ در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت گردد.

_ به منظور محافظت از نور، تا موقع مصرف درون جعبه نگهداری شود.

_ دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

_ از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

_ ۳۰ روز پس از باز کردن درپوش ظرف، باقیمانده دارو را دور بریزید.

شرکت کارخانجات داروپخش



تهران - ایران

REFERENCES:

_ UpToDate 2023

_ <https://www.medicines.org.uk/emc/product/836/smpc>