

استامینوفن

شیاف

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

موارد مصرف

- کاهش تب
- تسکین درد

راهنمایی های بیش از مصرف

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- اگر به استامینوفن یا هر جزء دیگری از این دارو حساسیت دارید.
- اگر به هر دارو، غذا یا مواد دیگری حساسیت دارید. به پزشک خود در مورد آلرژی و علائمی که تجربه کردید، اطلاع دهید.
- اگر بیماری کبدی دارید.
- به پزشک و داروساز خود در مورد تمام داروها (نسخه ای یا OTC، محصولات طبیعی، ویتامین ها) و بیماری های خود اطلاع دهید.

شما باید بررسی کنید تا مطمئن شوید که مصرف این دارو برای شما با تمام داروها و مشکلات سلامتی شما بی خطر است. بدون مشورت با پزشک، هیچ دارویی را شروع، قطع نکنید و یا تغییر ندهید.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف دارو را بر اساس شرایط هر فرد پزشک مشخص میکند اما نحوه مصرف

این دارو به شرح ذیل است:

دوز تعیین شده توسط پزشک هر ۴ تا ۶ ساعت در صورت نیاز.

نحوه استفاده شیاف برای کودک:

- هنگامی که این دارو را به کودکان می دهید، روده های کودک شما باید خالی باشد. اگر کودک شما نیاز به رفتن به دستشویی دارد، قبل از دادن شیاف مطمئن شوید که آنها این کار را انجام داده است.
- اگر به روی شکم یا پهلو روی تخت خوابیده باشد، دادن شیاف ممکن است آسان تر باشد.
- دست هایتان را بشوئید. سپس بسته بندی را جدا کنید تا شیاف خارج شود.از شکستن شیاف خودداری کنید.
- استفاده کنید.

- به آرامی شیاف را با انتهای نوک تیز به سمت پشتی کودک فشار دهید. برای سهولت در استفاده از شیاف می توانید آن را قبل از استفاده کمی بین دستان خود گرم کنید.
- سعی کنید یک یا دو دقیقه کودک خود را بی حرکت نگه دارید و سپس دست های خود را بشوئید.
- در صورت نیاز به دادن شیاف دیگر، روش فوق را مجدداً دنبال کنید.

هشدارها

- استامینوفن با نارسایی حاد کبدی همراه بوده و در مواقعی منجر به پیوند کبد و مرگ می شود. سمیت کبدی معمولاً با مصرف بیش از حد استامینوفن همراه است و اغلب شامل بیش از یک محصول حاوی استامینوفن می شود. از مصرف بیشتر از دوز توصیه شده توسط پزشک اکیدا خودداری کنید. علاوه بر این، دوز مزمن روزانه نیز ممکن است منجر به آسیب کبدی در برخی از بیماران شود.
- در صورت بروز حساسیت و یا مشاهده ی تظاهرات پوستی بعد از مصرف این دارو، بلافاصله مصرف این دارو را قطع کنید و به پزشک خود مراجعه کنید.
- در بیماران مبتلا به کمبود شناخته شده G6PD، نارسایی کلیه، نارسایی کبدی و یا سوء تغذیه مزمن با احتیاط مصرف شود.
- در صورت مصرف فرآورده های حاوی الکل، با احتیاط مصرف شود.
- در حین مصرف این دارو از مصرف فرآورده های دیگر حاوی استامینوفن خودداری کنید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

اگر باردار هستید، قصد بارداری دارید یا در حال شیردهی هستید، با پزشک و یا داروساز خود قبل از مصرف این دارو مشورت کنید.

موارد منع مصرف

- در صورت حساسیت به استامینوفن یا هر جزء دیگری از این فرمولاسیون و یا اختلال شدید کبدی، از مصرف این دارو خودداری کنید.

تداخلات دارویی و غذایی

از مصرف همزمان این دارو و فرآورده های حاوی الکل خودداری کنید زیرا مصرف همزمان این دو فرآورده میتواند خطر آسیب کبدی را افزایش دهد.

برخی از داروها با یکدیگر تداخل دارند و این می تواند اثر آنها را تغییر دهد.در صورت مصرف داروهای زیر به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید:

- داروهای ضد افسردگی مانند آمی تریپتیلین، ایمی پرامین

- باربیتورات ها مانند فنوباربیتال

- داروهای ضد تشنج مانند کاربامازپین و فنی توتین

- متوکلوپرامید

- دومپریدون

- کلسیترامین

- داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین

عوارض جانبی

مصرف هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض جانبی و ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز مکرر و آزاردهنده هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

اگر هر یک از علائم یا نشانه های زیر را دارید که ممکن است به یک عارضه جانبی بسیار بد مربوط باشد، مصرف دارو را قطع کرده و فوراً به پزشک خود اطلاع دهید و یا کمک پزشکی دریافت کنید:

- علائم یک واکنش آلرژیک، مانند بثورات پوستی؛ خارش؛ پوست قرمز، متورم، تاول دار یا پوسته پوسته شده یا با بدون تب؛ خس خس سینه؛ احساس تنگی در قفسه سینه یا گلو؛ مشکل در تنفس، بلع یا صحبت کردن؛ گرفتگی صدا غیر معمول؛ تورم دهان، صورت، لب ها، زبان یا گلو.

- علائم مشکلات کبدی مانند ادرار تیره، احساس خستگی، بی اشتها،ی، ناراحتی معده یا درد معده، مدفوع روشن، استفراغ، یا زردی پوست یا چشم.

- عدم توانایی در دفع ادرار و یا تغییر حجم ادرار

سایر عوارض جانبی:

- قرمزی یا درد در ناحیه ی مقعد

- ناراحتی معده و یا استفراغ

- مشکل در خوابیدن

مسمومیت

در صورت مصرف بیش از حد این دارو حتی اگر دچار عوارض خاصی نشدید، فوراً به پزشک خود و یا نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کنید زیرا مصرف بیش از اندازه استامینوفن می تواند منجر به آسیب تاخیری و جدی کبد شود.(ممکن است در ۲۴ ساعت اول هیچ علامتی وجود نداشته باشد، اگرچه رنگ پریدگی، حالت تهوع، استفراغ و درد شکم ممکن است رخ دهد.)

شرایط نگهداری

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و گرما نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش



تهران – ایران

REFERENCES: UpToDate Website

Medicines.org.uk/emc

