

آدیزان®

(سرماخوردگی بزرگسالان)

۱۰۰ قرص خط دار

هر قرص حاوی:

استامینوفن	۳۲۵ میلی گرم
فنیل افرین	۵ میلی گرم
کلرفنیرامین	۲ میلی گرم

موارد مصرف

تسکین علائم مرتبط با سرماخوردگی و آنفلوانزا مانند:

درد، تب، احتقان بینی، آبریزش بینی، عطسه، خارش چشم، بینی یا گلو

راهنمایی های پیش از مصرف

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- اگر به استامینوفن، فنیل افرین، کلرفنیرامین و یا هر جزء دیگری از این دارو حساسیت دارید.
- اگر به هر دارو، غذا یا مواد دیگر حساسیت دارید. به پزشک خود در مورد آلرژی و علائمی که داشتید، مانند راش، خارش، تنگی نفس، خس خس سینه، سرفه، تورم صورت، لب ها، زبان یا گلو و یا هر نشانه دیگری، اطلاع دهید.
- اگر در ۱۴ روز گذشته از داروهای خاصی که برای افسردگی استفاده می شوند مانند ایزوکاربوکسازید یا ترانیل سیپرومین یا داروهایی که برای بیماری پارکینسون استفاده می شوند مانند سلژیلین یا راسازیلین مصرف کرده اید. مصرف این دارو در عرض ۱۴ روز پس از آن داروها می تواند باعث فشار خون بسیار بد شود.
- به پزشک و داروساز خود در مورد تمام **داروها** (نسخه ای یا OTC، محصولات طبیعی، ویتامین ها) و **بیماری** های خود بگویید. شما باید بررسی کنید تا مطمئن شوید که مصرف این دارو برای شما با تمام داروها و مشکلات سلامتی شما بی خطر است. بدون مشورت با پزشک، هیچ دارویی را شروع، قطع نکنید و یا تغییر ندهید.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف دارو را بر اساس شرایط هر فرد پزشک مشخص میکند اما نحوه مصرف معمول

این دارو به شرح ذیل است:

بزرگسالان:

۱ تا ۲ عدد هر ۴ تا ۶ ساعت در صورت نیاز.

حداکثر مقدار مصرف در روز ۱۲ عدد قرص می باشد.

کودکان:

طبق دستور پزشک مصرف شود.

هشدارها

- در صورت مصرف بیش از ۴ گرم استامینوفن در روز و یا مصرف همزمان با فرآورده های حاوی الکل ممکن است سبب آسیب شدید کبدی شود.
- استامینوفن ممکن است باعث واکنش های پوستی شدید (مانند تاول، کهیر، قرمز شدن پوست و...) شود. در صورت بروز واکنش پوستی، مصرف را متوقف کرده و فوراً به دنبال کمک پزشکی باشید.
- از دوز توصیه شده روزانه تجاوز نکنید.
- تحریک پذیری ممکن است (به خصوص در کودکان) رخ دهد.
- مصرف همزمان این دارو با فرآورده های حاوی الکل و آرام بخش ها ممکن است باعث افزایش خواب آلودگی شوند.
- از مصرف فرآورده های الکلی اجتناب کنید.
- هنگام رانندگی با وسیله نقلیه موتوری یا کار با ماشین آلات احتیاط کنید.
- خواب آلودگی ممکن است رخ دهد.
- احتیاط در بیماران مسن، مبتلا به آسم، انسداد گردن مثانه، هایپرپلازی پروستات، دیابت، بیماری های قلبی عروقی، **COPD**، انسداد دستگاه گوارش، گلوکوم، نارسایی کبدی، پرکاری تیروئید، افزایش فشار داخل چشم، سوء تغذیه، نارسایی کلیوی، بیمارانی که داروهای تضعیف کننده سیستم عصبی مرکزی مصرف می کنند و یا کودکان کمتر از ۶ در مصرف این فرآورده.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

در هنگام بارداری و یا شیردهی قبل از مصرف این فرآورده با پزشک خود مشورت کنید.

موارد منع مصرف

• هنگام مصرف این دارو از هیچ داروی دیگر حاوی استامینوفن استفاده نکنید.

- اگر در حال مصرف داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز (ایزوکاربوکسازید، ترانیل سیپرومین، سلژیلین یا راسازیلین) هستید و یا کمتر از ۱۴ روز از قطع مصرف این داروها گذشته است، از مصرف قرص آدیزان خودداری کنید.
 - اگر به استامینوفن، فنیل افرین، کلرفنیرامین یا هر جزء دیگری از فرمولاسیون حساسیت دارید.
 - اگر تب بیشتر از ۳ روز و درد و احتقان بیشتر از ۷ روز طول کشید، فوراً به پزشک مراجعه کنید. (**درد شدید یا مکرر یا تب بالا یا ادامه دار ممکن است نشان دهنده یک بیماری جدی باشد**)
- در کودکان کمتر از دو سال منع مصرف دارد.

تداخلات دارویی و غذایی

برخی از داروها با یکدیگر تداخل دارند و این می تواند اثر آنها را تغییر دهد. در صورت مصرف داروهای زیر به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید:

ایزوکربوکسازید، لینزولید، سلژیلین، ترنیل سیپرومین، ایپراتروپیوم، تیوتروپیوم، آزلاستین، ارگوتامین، فرآورده های حاوی الکل، آمی تریپتیلین، استامینوفن، هیدروکدون، اکسی کدون، ضد درد های اپیوئیدی، بوپرنورفین، تیوریدازین، زولپیدم، کابرگولین، کلومیپرامین، کلسمیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم اکسی بات، دزی پرامین، دوکسپین، ارگوتامین، ایمی پرامین، مایروتیلین، متیل ارگونووین، متوکلوپرامید، نورتریپتیلین، اولوپاتادین

عوارض جانبی

مصرف هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض جانبی و ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز مکرر و آزاردهنده هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

افزایش فشار خون، تپش قلب، انقباض عروق محیطی و احشایی، گیجی، افسردگی، پریشانی، سرگیجه، تحریک پذیری، خستگی، سردرد، بیخوابی، بی قراری، آرام بخش، لرزش، بثورات پوستی، بی اشتها، غلیظ شدن ترشحات برونش، خس خس سینه

مسمومیت

در صورت مصرف تصادفی مقادیر زیادت از دوز تجویز شده، همراه دارو به مراکز درمانی مراجعه کنید.

شرایط نگهداری

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش



تهران - ایران

REFERENCES: www.uptodate.com , www.reference.medscape.com, <https://daily.med.nlm.nih.gov>