

سلکسیب®

(سلکوکسیب)

۱۰۰ عدد کپسول

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

موارد مصرف

مورد استفاده در کنترل و درمان:

- درد حاد
- استئوآرتریت
- روماتوئید آرتریت
- اسپوندیلیت آنکیلوزان
- آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان
- دیسمنوره اولیه (درد دوران قاعدگی)
- نقرص حاد

راهنمایی های پیش از مصرف

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- اگر به سلکوکسیب یا هر جزء دیگری از این دارو حساسیت دارید.
- اگر به آسپرین و یا NSAID ها (ایبوپروفن، ناپروکسن، دیکلوفناک و...) حساسیت دارید.
- اگر به هر دارو، غذا یا مواد دیگر حساسیت دارید. به پزشک خود در مورد آلرژی و علائمی که داشتید، اطلاع دهید.
- اگر بیماری کلیوی یا بیماری کبد دارید.
- اگر خونریزی گوارشی (معدۀ-روده ای) دارید.
- اگر برای باردار شدن مشکل دارید یا باروری خود را بررسی می کنید.
- اگر باردار هستید یا ممکن است باردار باشید.
- اگر هر NSAID (ایبوپروفن، ناپروکسن، دیکلوفناک و...) دیگری مصرف می کنید.
- اگر از داروی سالیسیلاتی مانند آسپرین استفاده می کنید.

به پزشک و دارو ساز خود در مورد **تمام داروها** (نسخه ای یا OTC، محصولات طبیعی، ویتامین ها) و **بیماری** های خود اطلاع دهید. شما باید بررسی کنید تا مطمئن شوید که مصرف این دارو برای شما با تمام داروها و مشکلات سلامتی ای که دارید بی خطر است. بدون مشورت با پزشک، هیچ دارویی را شروع، قطع نکنید و یا تغییر ندهید.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف دارو را بر اساس شرایط هر فرد پزشک مشخص میکند اما نحوه مصرف

این دارو به شرح ذیل است:

بزرگسالان

- درد حاد یا دیسمنوره اولیه: دوز شروع: ۴۰۰ میلی گرم، سپس ۲۰۰ میلی گرم اضافی در صورت نیاز در روز اول.
- دوز نگهدارنده: ۲۰۰ میلی گرم دو بار در روز در صورت نیاز
- اسپوندیلیت آنکیلوزان: ۲۰۰ میلی گرم یک بار در روز یا ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز. اگر بعد از ۶ هفته اثری نداشته باشد، ممکن است تا ۴۰۰ میلی گرم در روز افزایش یابد. اگر پس از ۶ هفته درمان با ۴۰۰ میلی گرم در روز پاسخی نداد، قطع و درمان جایگزین را در نظر بگیرید.
- استئوآرتریت: ۲۰۰ میلی گرم یک بار در روز یا ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز
- آرتریت روماتوئید: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی گرم دو بار در روز
- نقرص حاد: ۸۰۰ میلی گرم یک بار و سپس ۴۰۰ میلی گرم در روز اول. سپس ۴۰۰ میلی گرم دو بار در روز به مدت یک هفته

کودکان

- آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان (JIA): کودکان ≤ ۲ سال:

۱۰ تا ۲۵ کیلوگرم: ۵۰ میلی گرم دو بار در روز

< ۲۵ کیلوگرم: ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز

هشدارها

این دارو ممکن است احتمال عوارض جانبی قلبی عروقی مانند حمله قلبی و یا سکته را افزایش دهد. در صورت ابتلا به بیماری قلبی، خطر این عوارض جانبی ممکن است بیشتر باشد. با این حال، این خطر ممکن است در افرادی که بیماری قلبی یا خطر بیماری قلبی ندارند نیز افزایش یابد. این دارو را قبل یا بعد از جراحی بای پس قلب استفاده نکنید. این دارو ممکن است احتمال عوارض جانبی معده یا روده مانند زخم یا خونریزی را افزایش دهد. این خطر در افراد مسن و افرادی که قبلاً زخم معده، روده و یا خونریزی داشته اند بیشتر است.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

از مصرف خودسرانه این دارو در دوران بارداری و شیردهی بپرهیزید.

موارد منع مصرف

- در صورت حساسیت به سلکسیب، سولفونامیدها، آسپرین، سایر NSAID ها یا هر جزء دیگری از فرمولاسیون
- اگر در حال حاضر زخم فعال معده یا روده دارید.
- اگر در نتیجه مصرف آسپرین یا هر ضد التهاب و مسکن دیگری شما مبتلا به آسم، پولیپ بینی، گرفتگی شدید بینی یا آلرژی بوده اید.
- اگر باردار و یا شیرده هستید.
- اگر بیماری شدید کبدی، کلیوی و یا بیماری التهابی روده دارید.
- اگر نارسایی قلبی، بیماری عروق مغزی و یا بیماری شریانی محیطی دارید.

تداخلات دارویی و غذایی

برخی از داروها با یکدیگر تداخل دارند و این می تواند اثر آنها را تغییر دهد. در صورت مصرف داروهای زیر به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید:

- داروهای اعصاب (اختلالات اعصاب، تشنج، اختلالات افسردگی، اختلالات خواب و...)

- لیتیموم

- سیکلوسپورین و تاکرولیموس

- NSAIDs (کتورولاک، ایبوپروفن و...)

- متوترکسات

- تنوفوویر

- مهارکننده های ACE (کاپتوپریل، لیزینوپریل و...) ، آنتاگونیست های آنژیوتانسین II (لوزارتان، والسارتان و...) ، بتابلاکرها (متوپرولول، پروپرانولول و...) و دیورتیکها (فوروزماید)

- وارفارین یا سایر داروهایی مانند وارفارین (عوامل "رقیق کننده خون" که لخته شدن خون را کاهش می دهند) از جمله داروهای جدیدتر مانند آپیکسابان

- میفه پریستون

عوارض جانبی

مصرف هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض جانبی و ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز مکرر و آزاردهنده هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

اگر هر یک از موارد زیر رخ داد، مصرف سلکسیب را قطع کنید و فوراً به پزشک خود اطلاع دهید:

- یک واکنش آلرژیک مانند بثورات پوستی، تورم صورت، خس خس سینه یا مشکل در تنفس
- مشکلات قلبی مانند درد در قفسه سینه
- درد شدید معده یا هر نشانه ای از خونریزی در معده یا روده مانند مدفوع خونی یا استفراغ خونی
- یک واکنش پوستی مانند راش، تاول یا لایه برداری پوست
- نارسایی کبد (علائم ممکن است شامل حالت تهوع، اسهال، یرقان باشد).

سایر عوارض جانبی:

- فشار خون بالا
- حمله قلبی
- تجمع مایع در دست و پا
- عفونت های ادراری
- تنگی نفس، سینوزیت، انسداد یا آبریزش بینی، گلودرد، سرفه، سرماخوردگی، علائم شبیه آنفولانزا
- سرگیجه، مشکل در خوابیدن
- استفراغ، معده درد، اسهال، سوء هاضمه، نفخ
- راش، خارش
- سفتی عضلات
- مشکل در بلع
- سردرد
- حالت تهوع
- مفاصل دردناک
- بدتر شدن آلرژی های موجود

شرایط نگهداری

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش



تهران - ایران

REFERENCES: UpToDate Website

Medicines.org.uk/emc