

دیکلن® ۱ درصد

(دیکلوفناک دی اتیل آمونیوم)

ژل موضعی

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

موارد مصرف

دیکلوفناک به عنوان یک عامل ضد التهاب و ضد درد در درمان موارد به کار می رود:

- دردهای عضلانی خفیف تا متوسط
- کوفتگی ها
- درد های پس از ضربه
- درد آرتروز در مفاصل مانند مچ پا، آرنج، پا، دست، زانو و مچ دست

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف دارو را بر اساس شرایط هر فرد پزشک مشخص میکند اما نحوه مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

بزرگسالان و نوجوانان ۱۴ سال و بالاتر:

لایه های نازک ژل دیکلوفناک ۱٪ را در ناحیه مورد نظر ۳ تا ۴ بار در روز به آرامی مالش دهید.

مدت زمان درمان بستگی به مورد مصرف و پاسخ به درمان دارد.

دقت کنید از این فرآورده بر روی زخم های باز، چشم ها و یا غشاهای مخاطی استفاده نشود.

هشدارها

در صورت مشاهده ضایعات پوستی، مخاطی و یا واکنش های حساسیتی بعد از استعمال این ژل، مصرف این فرآورده را قطع کنید و به پزشک مراجعه کنید.

ژل دیکلوفناک ۱٪ فقط روی پوست سالم قابل استفاده است. (بر روی زخم های باز استفاده نکنید)

ژل دیکلوفناک ۱٪ نباید با بافت همینند یا غشاء مخاطی (مانند داخل دهان) تماس پیدا کند ناحیه تحت درمان با ژل دیکلوفناک ۱٪ نباید در معرض نور خورشید قرار گیرد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

بارداری

ژل دیکلوفناک ۱٪ در ۳ ماه آخر بارداری منع مصرف دارد، زیرا ممکن است به جنین آسیب برساند و یا در زایمان مشکل ایجاد کند. همچنین در ۶ ماه اول بارداری نیز این فرآورده باید تنها تحت نظر پزشک مصرف شود و دوز تا حد امکان کم نگه داشته شود و مدت درمان تا حد امکان کوتاه باشد.

شیردهی

ژل دیکلوفناک ۱٪ به مقدار کم وارد شیر مادر می شود. با این حال، ژل دیکلوفناک ۱٪

نباید بر روی سینه های مادران شیرده و یا در مناطق دیگر پوست به مساحت زیاد و یا برای مدت طولانی استفاده شود.

قبل از مصرف این فرآورده در دوران بارداری و یا شیردهی حتما با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

موارد منع مصرف

- در صورت حساسیت به دیکلوفناک یا هر جزء دیگری از این فرمولاسیون، حساسیت به آسپرین یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) که ممکن است به صورت آسم، کهیر یا سایر واکنش های آلرژیک خود را نشان دهد، از مصرف این فرآورده خودداری شود.

- این فرآورده در کودکان زیر ۱۴ سال منع مصرف دارد.

- این فرآورده در ۳ ماه آخر بارداری منع مصرف دارد.

- این فرآورده در نارسایی کلیه منع مصرف دارد.

- از مصرف این فرآورده بر روی پوست آسیب دیده از جمله درماتیت اگزوداتیو، اگزما، ضایعات عفونی، سوختگی یا زخم خودداری شود.

- در صورت داشتن زخم معده و یا بیماری التهابی فعال دستگاه گوارش از مصرف این فرآورده خودداری شود.

- این فرآورده در نارسایی شدید کبدی منع مصرف دارد.

عوارض جانبی

مصرف هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض جانبی و ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز مکرر و آزاردهنده هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

عوارض شایع (که ممکن است از هر ۱۰ نفر ۱ نفر را تحت تاثیر قرار دهد):

- بثورات پوستی
- اگزما
- قرمز شدن پوست
- التهاب پوست در ناحیه استعمال ژل
- خارش

مسمومیت

ژل دیکلوفناک بسیار ناچیز در جریان خون جذب می شود و در نتیجه اوردوز با آن در مصرف موضعی بعید است.

اگر شما یا کودکی به طور تصادفی ژل دیکلوفناک ۱٪ را قورت دادید، فوراً به پزشک، داروساز و یا نزدیک ترین مراکز درمانی مراجعه کنید.

شرایط نگهداری

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت گردد.

دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش

تهران - ایران



REFERENCES: UpToDate Website

Medicines.org.uk/emc