

بن کالویت®

قرص کلسیم + ویتامین D۳

هر قرص حاوی:

کلسیم کربنات	۵۰۰ میلی گرم کلسیم المتال
ویتامین D3	۴۰۰ واحد بین المللی

سایر ترکیبات: نشاسته ذرت، پوئیدون، منیزیم استارات، اتانول، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، تیتانیوم دی اکساید، پروپیلن گلیکول، موم نخل، آب

این قرص آورده مکمل است و جهت پیشگیری، تشخیص و یا درمان بیماری نمی باشد.

مورد مصرف این قرص آورده چیست؟

کمک به سلامت استخوان ها

قبل از مصرف این قرص آورده به چه نکاتی باید توجه کنید؟

قبل از مصرف این دارو برای بار اول شما باید با دکتر یا داروساز خود مشورت به بررسی کنید که میزان ویتامین D یا کلسیم خود بیش از حد پایین یا در معرض خطر نباشد

مقدار و نحوه مصرف این قرص آورده چگونه است؟

بزرگسالان بالای ۱۸ سال: روزانه ۱ الی ۲ عدد قرص پس از وعده اصلی غذا همراه یک لیوان آب کامل مصرف شود. یا طبق دستور پزشک.

مصرف این قرص آورده در دوران بارداری و شیردهی چگونه است؟

مصرف این قرص آورده در دوران بارداری و شیردهی مجاز نیست. مگر با دستور پزشک متخصص.

هشدارها

- پیش از مصرف این قرص آورده در موارد زیر با پزشک یا داروساز مشورت کنید:
- نارسایی کلیوی یا سنگ کلیه
- در صورت مصرف داروهای دیگر حاوی کلسیم و ویتامین D

مصرف هر داروی دیگری که حاوی ویتامین D باشد.

مصرف داروهای قلبی از جمله دیگوکسین یا سایر گلیکوزیدهای قلبی

آنتی بیوتیک های تتراسایکلین و فلوروکینولون (لوفلوکساسین و ...) توصیه می شود قبل از مصرف بن کالویت® حداقل ۳ ساعت پس از مصرف این داروها صبر کنید.

مصرف دیورتیک های تیازیدی

- اگر از داروهای دیگری که برای درمان اختلالات استخوانی استفاده می شود، مانند بیس فسفونات ها یا فلوراید سدیم استفاده می کنید، توصیه می شود که حداقل ۳ ساعت قبل از مصرف قرص های بن کالویت® زمان بگذارد.

- فنی توتین (دارویی برای صرع) و باربیتورات ها (داروهایی که برای صرع استفاده می شوند یا به خواب شما کمک می کنند)، زیرا ممکن است ویتامین D3 را کم اثر کند.

- اورلیستان (دارویی که برای درمان چاقی استفاده می شود)، کلاستیرامین، ملین ها مانند روغن پارافین، زیرا ممکن است میزان جذب ویتامین D3 را کاهش دهند.

منع مصرف

حساسیت به کلسیم، ویتامین D3 یا سایر مواد تشکیل دهنده.

سطح بالای کلسیم در خون (هایپرکلسمی) یا ادرار (هایپرکلسیوری)

مشکل نارسایی کلیه یا سنگ کلیه

سطح بالای ویتامین D در خون

این قرص آورده چه عوارض جانبی دارد؟

از مصرف این قرص آورده در دوزهای معمول عوارض جانبی خاصی گزارش نشده است. چنانچه حین مصرف به عوارض مکرر و آزاردهنده مانند معده درد، استخوان درد، تشنگی شدید، نیاز به دفع بیشتر ادرار، ضعف عضلانی، خواب آلودگی و گیجی دچار شدید با پزشک و داروساز برای ادامه مصرف قرص آورده مشورت کنید

شرایط نگهداری:

در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.

شرکت کارخانجات داروبخش

تهران - ایران



References:

1- www.medicines.org.uk/emc/