

او.آر.اس

پودر برای تهیه محلول خوراکی

۱- کاربرد مصرف:

خط اول جبران مایعات از دست رفته بدن ناشی از اسهال جلوگیری از مشکلات مربوط به کاهش مایعات و الکترولیت‌ها

۲- هشدار و راهنمایی‌های عمومی:

- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:

- وجود هرنوع حساسیت نسبت به داروهای حاوی سدیم، پتاسیم، کلر، سترات یا قند و هم چنین حساسیت به غذاها.

- در صورت ابتلا به تهوع شدید و تداوم آن، بیماری‌های انسدادی روده

- در صورت کم آبی شدید بدن

- در صورت ابتلا به مشکلات کبدی، کلیوی، دیابت، عدم تحمل برخی از قندها

- در طول مدت مصرف این دارو رعایت نکات ذیل توصیه می‌گردد:

- دارو را طبق دستور پزشک مصرف نمایید. از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده، خودداری کنید.

- پودر داخل هر ساشه را در یک لیتر (تقریباً ۴ لیوان متوسط) آب آشامیدنی و یا آب جوشیده سرد شده حل کنید و به تدریج میل نمایید. از اضافه نمودن آب بیشتر و جوشاندن محلول خودداری نمایید.

- بهتر است محلول او.آر.اس را بلافاصله قبل از مصرف تهیه نمود.

- در نوزادان به آهستگی در مقادیر کم با قاشق و در طی ۲۴ ساعت اولیه شروع اسهال داده شود

- درمان را تا توقف اسهال ادامه دهید.

- مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی با تشخیص پزشک متخصص مجاز است.

۳- مقدار و نحوه مصرف دارو:

- جهت جبران کمبود آب و الکترولیت‌ها:

محلول را باید جرعه‌جرعه نوشید تا میزان آب موجود در معده موجب حالت تهوع فرد نشود؛ در کودکان، مصرف مقدار کم و مکرر بهتر تحمل می‌شود. مقدار آب نباید کمتر یا بیشتر از دستور بسته باشد، زیرا غلظت املاح تغییر می‌کند.

محلول را با شیر، آبمیوه یا نوشابه مخلوط نکنید. درجهت بهبود طعم محلول بهتر است از محلول خنک استفاده نمود.

بین نوبت‌های مصرف محلول او-آر-اس، در صورت بروز تشنگی، آب آشامیدنی بنوشید.

✦ بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۰ سال - مقدار مصرف براساس وزن بدن و توسط پزشک تعیین می‌گردد. در شروع درمان مقدار مصرف معمول ۵۰ تا ۱۰۰ میلی لیتر محلول برای

هر کیلوگرم وزن بدن، هر ۴ تا ۶ ساعت (و یا بعد از هر بار اسهال آیکی) که می‌تواند براساس پاسخ بیمار و میزان تشنگی تغییر نماید.

✦ کودکان ۲ تا ۱۰ سال - مقدار مصرف براساس وزن بدن و توسط پزشک تعیین می‌گردد.

در شروع درمان مقدار مصرف معمول ۵۰ میلی لیتر محلول برای هر کیلوگرم وزن بدن طی چهار تا شش ساعت اولیه، سپس ۱۰۰ میلی لیتر به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن طی ۱۸ تا ۲۴ ساعت بعد که می‌تواند براساس پاسخ بیمار و میزان تشنگی تغییر کند، اما مقدار مصرف نباید طی هر ۲۰ دقیقه از ۱۰۰ میلی لیتر بیشتر شود.

✦ اطفال تا سن ۲سال - مقدار مصرف براساس وزن بدن و توسط پزشک تعیین می‌گردد.

در شروع درمان مقدار مصرف ۷۵ میلی لیتر به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در طول ۸ ساعت اول و ۷۵ میلی لیتر به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در طول ۱۶ ساعت بعد، پزشک می‌تواند براساس پاسخ بیمار و میزان تشنگی مقدار مصرف را تغییر دهد. اما مقدار مصرف نباید طی هر ۲۰ دقیقه از ۱۰۰ میلی لیتر بیشتر شود.

✦ نوزادان کمتر از ۱ سال - مصرف این دارو در کودکان زیر ۱ سال فقط با نظارت و تشخیص پزشک امکان پذیر است.

۴- عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب، ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگر چه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، ولی در صورت بروز هر یک از آنها، با پزشک مشورت نمایید:

علامت ناشی از افزایش سدیم در بدن: تشنج، سرگیجه، ضربان تند نبض، بالا رفتن فشارخون، تحریک پذیری و بی‌قراری، ورم در ناحیه پاها و ضعف.

علامت افزایش مایعات در بدن: پف کردن پلک‌ها.

نشانه‌های واکنش آلرژیک: بثورات پوستی؛ کهیر؛ خارش؛ قرمزی، تورم، تاول یا پوسته پوسته شدن پوست با یا بدون تب؛ خس خس سینه؛ گرفتگی سینه یا گلو؛ مشکل در تنفس، بلع یا صحبت کردن؛ گرفتگی غیرمعمول صدا؛ تورم دهان، صورت، لب‌ها، زبان یا گلو.

علامت ایجاد اختلال در مایعات و الکترولیت‌های بدن: تغییرات خلقی، گیجی، درد یا ضعف عضلاتی، ضربان قلب غیرطبیعی، سرگیجه یا غش بسیار شدید، ضربان قلب سریع، تشنگی بیشتر، تشنج، احساس خستگی یا ضعف شدید، گرسنگی ناکافی، عدم توانایی در دفع ادرار یا تغییر در میزان ادرار تولید شده، خشکی دهان، خشکی چشم یا ناراحتی شدید معده یا استفراغ.

سایر عوارض جانبی به مرور زمان و تطبیق بدن با دارو از بین می‌روند. به هر حال در صورت ادامه یا مزاحمت عوارضی مانند تهوع و استفراغ با پزشک تماس حاصل نمایید.

۵- شرایط نگهداری:

ساشه خشک را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از رطوبت، گرما و نور مستقیم نگهداری کنید. از نگهداری و مصرف محلول آماده بیش از ۲۴ ساعت خودداری نمایید. از مصرف و نگهداری داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروبخش
تهران - ایران

