

ویتامین ب₁ 100 و 300 میلی گرم

100 قرص خط دار

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

موارد مصرف

این فرآورده از خانواده ویتامین ب می باشد و جهت جبران کمبود تیامین (ویتامین B₁) بدن مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه این ویتامین به طور طبیعی تقریباً در تمام بافت‌های زنده وجود دارد و یا تقریباً از تمام غذاها (به ویژه مخمر، غلات سیوس‌دار، گوشت و لوبیا) به دست می‌آید، اگر تیامین کافی در رژیم غذایی دریافت نشود، علائم جسمی ناخوشایندی ایجاد می‌شود.

راهنمایی های پیش از مصرف

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

اگر به تیامین و یا هر جزء دیگری از این دارو حساسیت دارید.

اگر به هر دارو، غذا یا مواد دیگر حساسیت دارید. به پزشک خود در مورد آلرژی و علائمی که تجربه کرده اید، مانند راش، خارش، تنگی نفس، خس خس سینه، سرفه، تورم صورت، لب ها، زبان یا گلو و یا هر نشانه دیگری اطلاع دهید.

این دارو ممکن است با سایر داروها یا مشکلات سلامتی تداخل داشته باشد.

به پزشک و داروساز خود در مورد تمام داروها (نسخه ای یا OTC، محصولات طبیعی، ویتامین ها) و بیماری های خود اطلاع دهید. شما باید بررسی کنید تا مطمئن شوید که مصرف این دارو برای شما با تمام داروها و مشکلات سلامتی شما بی خطر است. بدون مشورت با پزشک، هیچ دارویی را شروع و قطع نکنید و یا تغییر ندهید.

مقدار و نحوه مصرف

مقدار مصرف دارو را بر اساس شرایط هر فرد پزشک مشخص میکند اما نحوه مصرف معمول این دارو به شرح ذیل است:

بزرگسالان: روزانه یک عدد قرص مصرف شود.

هشدارها

غلظت بالای تیامین در خون می تواند بر برخی آزمایشات پزشکی تأثیر بگذارد. اگر آزمایش خون، اسکن یا هر آزمایش پزشکی دیگری انجام می دهید، به پزشک خود بگویید که از قرص تیامین هیدروکلراید استفاده می کنید.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

پیش از مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی، با پزشک خود مشورت کنید.

موارد منع مصرف

اگر به تیامین هیدروکلراید و یا هر جزء دیگری از این قرص حساسیت دارید، از مصرف این فرآورده خودداری کنید.

یک واکنش آلرژیک ممکن است به صورت بثورات پوستی، خارش، تورم صورت و لب‌ها و یا تنگی نفس ظاهر شود.

تداخلات دارویی و غذایی

- اگر از فلوراووراسیل (که برای درمان برخی سرطان ها و عفونت های ویروسی استفاده می شود) استفاده می کنید به پزشک خود اطلاع دهید زیرا ممکن است نیاز به تنظیم دوز قرص ویتامین ب₁ 300 باشد.
- اتانول ممکن است جذب تیامین(ویتامین ب₁) را کاهش دهد. در بیمارانی که سابقه سوء مصرف اتانول دارند ممکن است به دوزهای بالاتر نیاز باشد.
- رژیم های غذایی پر کربوهیدرات ممکن است نیاز به تیامین(ویتامین ب₁) را افزایش دهد.

عوارض جانبی

مصرف هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض جانبی و ناخواسته نیز بشود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت بروز مکرر و آزاردهنده هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید.

بعید است که این قرص عوارض جانبی ایجاد کند، مگر اینکه به تیامین یا یکی از مواد دیگر موجود در قرص تیامین هیدروکلراید حساسیت بیش از حد داشته باشید. واکنش های حساسیت بیش از حد به تیامین گزارش شده است، اما بیشتر زمانی که از طریق تزریق انجام شده باشد.

افراد بسیار کمی ممکن است پس از مصرف این دارو واکنش آلرژیک را تجربه کنند، علائم آن می تواند به شرح زیر باشد:

بثورات یا تحریک پوست؛ تورم صورت، لب ها، گلو یا زبان؛ دل درد؛ مشکل در تنفس یا بلع؛ نبض سریع؛ درد قلب

برخی از افراد ممکن است پس از مصرف این دارو دچار ناراحتی معده خفیف شوند که علائم آن عبارتند از: حالت تهوع؛ استفراغ؛ دل درد؛ اسهال.

در صورت مشاهده هر گونه احساس یا علائم غیرعادی، مصرف قرص ها را قطع کرده و در اسرع وقت با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.

مسمومیت

در صورت مصرف تصادفی مقادیر زیادتر از دوز تجویز شده، همراه دارو به مراکز درمانی مراجعه کنید.

شرایط نگهداری

در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

شرکت کارخانجات داروپخش

تهران - ایران



REFERENCES: UpToDate Website
Medicines.org.uk/emc