

- در صورت ابتلا به زخم های گوارشی و یا کولیت از مصرف این فرآورده خودداری کنید.
- از مصرف بیش از ۶ ماه متوالی این فرآورده ، خودداری کنید.
- همزمان با مصرف فرم تزریقی آهن از مصرف شکل خوراکی آن اجتناب کنید.

تداخلات دارویی

- در صورت مصرف هر داروی دیگری با پزشک و داروساز کودک مشورت کنید.

این فرآورده چه عوارض جانبی دارد؟

- در صورتیکه حین مصرف فرآورده ناراحتی و گریه کودک بیش از حد معمول گردید و علائم دلپیچه و دل درد مشاهده گردید با پزشک و داروساز برای ادامه مصرف فرآورده مشورت کنید.

در صورت مصرف بیش از حد این فرآورده چه اقداماتی لازم است؟

- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده، کودک را سریعاً به همراه جعبه محصول به مراکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداری

- فرآورده را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت کنید.
- دور از دسترس کودکان قرار دهید .
- از نگهداری و مصرف فرآورده تاریخ گذشته خودداری نمایید.

شرکت کارخانجات داروپخش
تهران - ایران



References:

- 1-<https://www.medicines.org.uk/emc/>
- 2-www.uptodate.com

مورد مصرف این فرآورده چیست؟

کمک به تامین آهن مورد نیاز بدن و پیشگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن

قبل از مصرف این فرآورده به چه نکاتی باید توجه کنید؟

قبل از مصرف این فرآورده، در موارد زیر با داروساز یا پزشک مشورت نمایید:

- وجود هر نوع حساسیت نسبت به فرآورده های حاوی آهن و همچنین حساسیت به سایر ترکیبات مندرج روی جعبه
- در صورت ابتلا به عفونت کلیه ، بیماری کبدی، آسم، کولیت یا سایر بیماری های روده، کم خونی هایی که علل آنها فقر آهن نمی باشد، بیماری افزایش آهن بدن

مقدار و نحوه مصرف این فرآورده چگونه است؟

مقدار مصرف دارو باید طبق دستور پزشک با توجه به نیاز هر فرد باشد اما مقدار مصرف معمول این فرآورده به شرح زیر است:

کودکان ۱۲-۷ ماه : روزانه ۱۵-۲۵ قطره (۰.۵ الی ۱ میلی لیتر)، یا طبق دستور پزشک

- به منظور جلوگیری از لکه دار شدن دندانها، دارو را در قسمت انتهایی زبان ریخته و سپس مقداری آب یا آب میوه به کودک بنوشانید.

- در صورت فراموش نمودن یک نوبت مصرف دارو، از مصرف آن نوبت خودداری کرده و مقدار مصرف بعدی را دو برابر نکنید.

هشدارها

- در صورت هرگونه حساسیت به آهن یا سایر ترکیبات روی جعبه پیش از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت کنید.